



Naproxen oralt

(ex Pronaxen) tabletter

Försiktighet vid gastroenterit, långvarig feber och nedsatt njur- och leverfunktion.

Ökad blödningsbenägenhet, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 250 mg och 500 mg (ex Pronaxen)
Enterotablett 250 mg och 500 mg (ex Naprosyn)

ADMINISTRERING

Oralt:

Naproxen Bluefish 250 mg samt Pronaxen 250 mg kan delas i två lika stora doser. Brytskåra på övriga preparat behöver inte betyda att tablettens kan delas i två jämna doser, se respektive produktresumé.
Enterotabletter sväljes hela, de är överdragna med ett magsaftresistent skikt för att skydda magslemhinnan.

Enteralt:

Vanliga tabletter kan krossas, lösas upp i vatten och administreras enteralt. Går även att administrera i jejunum.
Enterotabletter kan ej administreras enteralt.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Naproxen (registrerad produkt)

Enterotablett

Förvaras i rumstemperatur. Ljuskänsligt, förvaras i originalförpackningen. Gäller båda styrkorna.

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Pronaxen och Naproxen Orifarm är ljuskänsliga, förvaras i originalförpackningen. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Smärta, lätt - måttlig intensitet

Barn 5 - 18 år: 5 mg/kg x 2. Max 1000 mg/DYGN

Alternativt (fast dosering):

Barn från 5 år upp till 49 kg: 125 mg x 2

Barn 50 - 59 kg: 250 mg x 2

Barn från 60 kg: 500 mg x 2

Migrän

Behandling påbörjas vid första tecken på migrän.

Barn från 5 år upp till 49 kg: 5 - 7,5 mg/kg x 1 - 2.

För maxdos, se fast dosering nedan.

Alternativt (fast dosering):

Barn från 5 år upp till 34 kg: 125 mg x 1 - 2

Barn 35 - 49 kg: 250 mg x 1 - 2

Barn från 50 kg:

Dygn 1: 750 mg initialt, därefter 250 mg vid behov. Max 1250 mg/DYGN

Från dygn 2: 250 mg vid behov, max 1000 mg/DYGN

Juvenil idiopatisk artit

Barn 5 - 18 år: 5 - 7,5 mg/kg x 2. Max 1000 mg/DYGN

Alternativt (fast dosering):

Barn från 5 år upp till 34 kg: 125 mg x 2

Barn 35 - 49 kg: 250 mg x 2

Barn 50 - 59 kg: 375 mg x 2

Barn från 60 kg: 500 mg x 2





Naproxen oralt

(ex Pronaxen) tabletter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Dysmenorré

Behandling påbörjas vid första tecken på menstruation.

Barn 10 - 18 år: 5 - 7,5 mg/kg x 2.
För maxdos, se fast dosering nedan.

Alternativt (fast dosering):

Barn från 10 år upp till 34 kg: 125 mg x 2

Barn 35 - 49 kg: 250 mg x 2

Barn 50 - 59 kg: 375 mg x 2

Barn från 60 kg:

Dygn 1: 250 - 500 (-750 mg) x2. Max 1250 mg/DYGN

Från dygn 2: 250 - 500 mg x 2. Max 1000 mg/DYGN

ÖVRIG INFORMATION

Naproxen är kontraindicerat vid ökad blödningsbenägenhet, pågående/återkommande GI-blödningar, gravt nedsatt leverfunktion och NSAID-känslighet.

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion (inkl pyelonefrit), dehydrering och vid varicella zosterinfektion.

Naproxen kan ge ökad blödningsbenägenhet, efter intag av naproxen bör det därför gå minst 48 timmar innan procedur, som ryggstick, utförs.

Allvarliga akuta astmaanfall kan förvärras av naproxen. Astmadiagnos i sig är dock inget hinder för att ordinera naproxen.





Naproxen oralt (ex Pronaxen) tabletter

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Internetadress Kortfattad översikt över antikoagulantia och ryggbedövning

[https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-](https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-5b_Kortfattad_oversikt_over_antikoagulantia_och_ryggbedovning_110328.pdf)

[5b_Kortfattad_oversikt_over_antikoagulantia_och_ryggbedovning_110328.pdf](https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-5b_Kortfattad_oversikt_over_antikoagulantia_och_ryggbedovning_110328.pdf)

Internetadress Ryggbedövning och antikoagulantia

<https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/ryggbedovning-och-antikoagulantia/>

Internetadress SFBABI - Riktlinjer för smärtbehandling hos barn, Akut och postoperativ smärta

<https://sfai.se/riktlinje/riktlinjetrad/>

Internetadress UpToDate

<http://www.uptodate.com/>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Breivik H et al. Nordic guidelines for neuraxial blocks in disturbed haemostasis from the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. *Acta Anaesthesiol Scand.* 2010 Jan;54(1)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19839941>

PubMed PMID Kanabar D, Dale S, Rawat M. A review of ibuprofen and acetaminophen use in febrile children and the occurrence of asthma-related symptoms. *Clin Ther.* 2007 Dec;29(12):2716-23.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18201589>

PubMed PMID Kauffman RE, Lieh-Lai M. Ibuprofen and increased morbidity in children with asthma: fact or fiction? *Paediatr Drugs.* 2004;6(5):267-72.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15449966>





Naproxen oralt

(ex Pronaxen) tabletter

PubMed PMID Richer L et al. Drugs for the acute treatment of migraine in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 19;4(4)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27091010>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA)

<https://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/Farm-beh-2020-06-09.pdf>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4939

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 4939

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-10-23

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT