



Vaccin: Hexyon intramuskulär inj

mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Avdödat hexavalent vaccin med fulldos mot difteri, stelkramp och kikhosta (DTP)

Förfylld spruta 0,5 mL, ska ej spädas

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion:

Sprutan ska omskakas väl innan administrering. Vaccinet ska vara en homogen, vitaktig, grumlig suspension.

Barn under 1 år: Ges i mellersta delen av lårets utsida (anterolaterala delen).

Barn från 1 år: Ges i övre tredjedelen av överarmens utsida (i deltoideusmuskeln).

Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Hexyon (medicinteknisk produkt)

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt. Kan förvaras i temperatur upp till 25 °C i högst 72 tim och inom den perioden antingen användas eller kasseras.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Grundvaccination av barn födda före gestationsvecka 32+0

Dessa barn får en extra dos hexavalent vaccin i tidig ålder och följer sedan det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

OBS! Om första dosen ges efter 10+0 veckors okorrigerad ålder räknas denna dos som första ordinarie dos i det allmänna vaccinationsprogrammet, dvs en extra dos ges inte. Resterande 2 doser ges då vid 5 mån respektive 12 mån ålder (se nästa indikation).

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 1 (extra dos) ges enligt följande:

Gestationsvecka vid födelse:	Tidigaste ålder för vaccination:
Mindre än 26+0	Gestationsvecka 34+0 (minst 1 vecka före hemgång)
26+0 till 29+6	6+0 veckor okorrigerad ålder
30+0 till 31+6 (vid samsjuklighet)	6+0 veckor okorrigerad ålder
30+0 till 31+6 (utan samsjuklighet)	8+0 veckor okorrigerad ålder

Det bör gå minst 4 veckor mellan den extra dosen och den efterföljande dosen.

Dos 2: vid 3 mån okorrigerad ålder

Dos 3: vid 5 mån okorrigerad ålder

Dos 4: vid 12 mån okorrigerad ålder

Grundvaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet

Barn födda från gestationsvecka 32+0 till fullgången tid.

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 1: vid 3 mån ålder (tidigast vid 2,5 mån ålder)

Dos 2: vid 5 mån ålder (tidigast 6 v efter dos 1)

Dos 3: vid 12 mån ålder (tidigast 6 mån efter dos 2)





Vaccin: Hexyon intramuskulär inj

mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Påskyndad grundvaccinering

Ska ordineras av läkare.

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 1: tidigast vid 6 v ålder

Dos 2: tidigast 1 mån efter dos 1

Dos 3: tidigast 1 mån efter dos 2

Dos 4: vanligen vid 12 mån ålder (tidigast 6 mån efter dos 3)

Post-expositionsprofylax dos 3 - 5, nyfödd till moder med hepatit B

Dos 1 - 2 ges med monovalent vaccin vid födseln och 1 mån ålder, se annan instruktion.

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 3: vid 3 mån ålder (tidigast vid 2,5 mån ålder)

Dos 4: vid 5 mån ålder (tidigast 6 v efter dos 1)

Dos 5: vid 12 mån ålder (tidigast 6 mån efter dos 2)

ÖVRIG INFORMATION

Barnhälsovården rekommenderar att varje barn får de två första doserna (primärdoserna) med samma vaccin, vid booster dosen (12 mån) kan byte ske. Vid brist på ett vaccin ska inte en dos fördröjas utan då kan byte göras redan vid dos 2.

Enligt Barnhälsovården kan vaccinering av prematurt nyfödda barn göras med Hexyon trots sparsam dokumentation för denna patientgrupp. I godkänd produktresumé finns inte indikation för denna patientgrupp.





Vaccin: Hexyon intramuskulär inj

mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogrammet

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer om vaccination mot hepatit B

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/?pub=56936>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccinationsprogram för barn. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-en-kunskapsoversikt-for-halsovardspersonal/>

Internetadress SKL - Rekommendationer från Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp för vaccinationer angående övergång mellan olika vaccin i samband med nationell vaccinupphandling 2018 och 2019

<https://www.sklikommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/vaccin-enligt-nationella-barnvaccinprogrammet-2018/rekommendationer-fran-barnhalsovardens-nationella-arbetsgrupp-for-vaccin....pdf>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-03-09

ePedID: 4942

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-11

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-03-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT