



Etosuximid oralt 250 mg

kapsel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel 250 mg (Ethosuximide Orifarm)

Etosuximid finns även som oral lösning 50 mg/mL, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt: Ska tas i samband med eller efter måltid.

Enteralt: Använd oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Etosuximid (registrerad produkt)

250 mg, Kapsel, mjuk

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Gäller även licenspreparat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordineras i samråd med barnneurolog.

Epilepsi, framför allt absenser

För barn under 35 kg rekommenderas i första hand oral lösning, se annan instruktion.

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 5 - 7,5 mg/kg x 2

Därefter veckovis upptitrering till symtomkontroll.

Vanlig underhållsdos: 10 - 12,5 mg/kg x 2

Maxdos 40 mg/kg/DYGN eller 1,5 gram/DYGN. Högre doser kan behövas till vissa patienter.

ÖVRIG INFORMATION

Etosuximid kapsel har tidigare endast funnits tillgänglig som licenspreparat (ex Petnidan).

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid epilepsi
www.lakemedelsverket.se/behandling-epilepsi

PubMed PMID Brigo F, Igwe SC. Cochrane Database Syst. Rev 2017. Ethosuximide, sodium valproate or lamotrigine for absence seizures in children and adolescents.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28195639>

Rekommendation (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrik Förening - Epilepsi hos barn och ungdomar - Handläggningsstöd

<https://snpf.barnlakarforeningen.se/varprogram-2/>



Etosuximid oralt 250 mg kapsel



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-10-27

ePedID: 4948

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-10-28

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-10-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT