



## Amiodaron oralt (ex Cordarone)

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 100, 200 mg (Cordarone).  
Extemporekapslar med valfri styrka.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletterna får inte delas.

Bör tas i samband med mat för att undvika gastrointestinala biverkningar.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Amiodaron (registrerad produkt)

100 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.  
Ljuskänsligt. Gäller även 200 mg.

#### Amiodarone (extempore - ej lagervara)

10 mg, KAPSLAR

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.  
Ljuskänsligt. Gäller alla styrkor.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med kardiolog.  
Dosen justeras utifrån respons.  
Lägsta möjliga underhållsdos ska eftersträvas.

**Långtidsbehandling av mycket svårbehandlade, potentiellt livshotande arytmier.  
Endast då annan behandling inte har fungerat.**

Sätts in ineliggande med daglig EKG-kontroll och i vissa fall kontinuerlig EKG-övervakning.

Laddningsdos:  
5 mg/kg x 2, max 400 mg/DYGN i 7 - 10 dagar

Underhållsdos:  
5 mg/kg x 1, max 200 mg/DYGN  
2,5 mg/kg/dygn är vanligen att betrakta som en minimidos.

Amiodaron oralt kan ges 5 eller 7 dagar/vecka.

### ÖVRIG INFORMATION

Amiodaron har varierad och långsam elimination med rapporterad halveringstid vid långtidsbehandling mellan 20 och 100 dagar. Steady-state för plasmakoncentrationen uppnås efter en till flera månader. Efter avslutad behandling kan effekten kvarstå i 10 dagar upp till en månad.

Kräver regelbunden uppföljning med ögonundersökning, leverstatus och blodstatus. Kontroll av TSH, T3 och T4 ska ske före behandlingsstart och regelbundet under behandlingstiden.

S-amiodaron ska ligga mellan 1 och 4 mikromol/L vid kontroll.

Interagerar med bl.a digoxin och flekainid, där man ofta behöver sänka de doserna med 25 - 30 %.



## Amiodaron oralt (ex Cordarone)



### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkartidningen Läkemedelsutlöst arytm svårfångad biverkan Darpö B, 2006

[http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/3/3695/LKT0614s1094\\_1095.pdf](http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/3/3695/LKT0614s1094_1095.pdf)

Rekommendation ,(Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-11-17

ePedID: 4953

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-12-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-12-18

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**