



Amiodaron oralt

(ex Cordarone) tabletter/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 100, 200 mg (ex Cordarone)
Extemporekapslar med valfri styrka (Amiodaron APL)

ADMINISTRERING

Vissa tabletter har en skåra, men den är inte till för att dela tablett i två lika stora doser utan endast för att underlätta nedsväljning.

Bör tas i samband med mat för att undvika gastrointestinala biverkningar.

Oralt:

Tabletten bör sväljas hel pga mycket bitter smak. Vid sväljsvårigheter kan tablett krossas och blandas med en liten mängd mjuk mat.

Enteralt:

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Amiodaron (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Gäller båda styrkorna.

Amiodaron APL (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med kardiolog.
Dosen justeras utifrån respons.
Lägst möjliga underhållsdos ska eftersträvas.

Långtidsbehandling av mycket svårbehandlade, potentiellt livshotande arytmier, då annan behandling inte har fungerat

Sätts in inläggande med daglig EKG-kontroll och i vissa fall kontinuerlig EKG-övervakning.

Laddningsdos:

5 - 10 mg/kg x 2 alternativt 4 mg/kg x 3, max 200 mg/DOS

Ges i 7 - 10 dagar.

Underhållsdos:

4 - 5 mg/kg x 1 (- 2), max 200 mg/DYGN

När underhållsbehandlingen är stabil kan amiodaron ges 5 dagar/vecka.

ÖVRIG INFORMATION

Amiodaron har varierad och långsam elimination med rapporterad halveringstid vid långtidsbehandling mellan 20 och 100 dagar. Steady-state för plasmakoncentrationen uppnås efter en till flera månader. Efter avslutad behandling kan effekten kvarstå i 10 dagar upp till en månad.

Kräver regelbunden uppföljning med ögonundersökning, leverstatus och blodstatus. Kontroll av TSH, T3 och T4 ska ske före behandlingsstart och regelbundet under behandlingstiden.

S-amiodaron ska ligga mellan 1 och 4 mikromol/L vid kontroll.

Interagerar med bl.a digoxin och flekainid, där man ofta behöver sänka doserna av dessa läkemedel med 25 - 30 %.



Amiodaron oralt

(ex Cordarone) tabletter/kapslar



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4953

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-07-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT