



Amiodaron oralt

(ex Cordarone) tabletter/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 100, 200 mg (ex Cordarone)
Extemporekapslar med valfri styrka (Amiodaron APL)

ADMINISTRERING

Vissa tabletter har en skåra, men den är inte till för att dela tablett i två lika stora doser utan endast för att underlätta nedsväljning.

Bör ges i samband med mat för att undvika gastrointestinala biverkningar.

Oralt:

Tabletten har bitter smak. Vid sväljsvårigheter kan tablett krossas och blandas med en liten mängd mjuk mat i direkt anslutning till administrering.

Extemporekapseln kan öppnas och innehållet slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering.

Enteralt:

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering. Extemporekapseln kan öppnas och innehållet slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Amiodaron (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Gäller båda styrkorna.

Amiodaron APL (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med barnkardiolog och sätts in när patienten är inläggande.

Kontroll av EKG, TSH samt S-Kalium ska ske före behandlingsstart och regelbundet under behandlingstiden.

Kräver regelbunden uppföljning med ögonundersökning, leverstatus och blodstatus.

Dosen justeras utifrån respons. Lägsta möjliga underhållsdos ska eftersträvas.

Vid behandling som överstiger 5 dygn kan dossänkning behöva göras på grund av dess långa halveringstid med risk för ackumulering och allvarliga biverkningar.

Långtidsbehandling av mycket svårbehandlade, potentiellt livshotande arytmier, där annan behandling inte har fungerat

Laddningsdos:

Nyfödda: 5 - 10 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 5 - 10 mg/kg x 2, max 200 mg/DOS

Behandlingstid: vanligen i 5 - 7 dagar.

Underhållsdos:

Nyfödda: 4 - 5 mg/kg x 1 (- 2)

Barn 1 mån - 18 år: 4 - 5 mg/kg x 1 (- 2), max 200 mg/DYGN

När underhållsbehandlingen är stabil kan dosen reduceras till lägsta effektiva dos, vanligen 2,5 mg/kg/DYGN.





Amiodaron oralt

(ex Cordarone) tabletter/kapslar

ÖVRIG INFORMATION

Amiodaron har varierad och långsam elimination med en halveringstid mellan 20 och 100 dagar vid långtidsbehandling. Steady-state för plasmakoncentrationen uppnås efter en till flera månader. Efter avslutad behandling kan effekten kvarstå i 10 dagar upp till en månad.

S-amiodaron ska ligga mellan 1 och 4 mikromol/L vid kontroll.

Amiodaron har en QTc- förlängande effekt och interagerar med ett flertal andra läkemedel, vilket innebär vid kombinationsbehandling med QTc förlängande läkemedel en påtaglig risk för förlängd QTc-tid och allvarliga ventrikulära arytmier. Interaktioner kan observeras i flera månader efter utsättande av amiodaron på grund av dess långa halveringstid.



Amiodaron oralt (ex Cordarone) tabletter/kapslar



REFERENS/LÄNK

Artikel PEDIATRIC. Marcia L. Amiodarone Use in Children. PHARMACOTHERAPY. A Monthly Newsletter for Health Care Professionals from the Children's Medical Center at the University of Virginia, 2001.

<https://med.virginia.edu/pediatrics/wp-content/uploads/sites/237/2015/12/200112.pdf>

Australasian Neonatal Medicines Formulary (ANMF) - Amiodarone

https://www.anmfonline.org/wp-content/uploads/2023/09/Amiodarone_ANMFv1.0_20240815-1.pdf

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medication Management Manual, Perth Children's Hospital, Australia. MONOGRAPH, AmiODAROne (Jun 2024)

<https://www.pch.health.wa.gov.au/~media/Files/Hospitals/PCH/General-documents/Health-professionals/MedicationMonographs/Amiodarone.pdf>

Micromedex

PubMed PMID C Hill A et al. A comparison of oral flecainide and amiodarone for the treatment of recurrent supraventricular tachycardia in children. Pacing Clin Electrophysiol, 2019.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30875081>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger

ePedID: 4953

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-02-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT