



Vankomycin oralt

(ex Vancocin) kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel 125 mg (ex Vancocin)
Kapsel 250 mg (Vancomycin Strides)

För doser under 125 mg rekommenderas vankomycin oral lösning, se annan instruktion.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Undvik dammbildning och kontakt med hud och/eller ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion och/eller allvarlig ögonirritation.

ADMINISTRERING

Oralt: kapslarna måste sväljas hela.

Enteralt:

Oral lösning rekommenderas. Kapslarna är svåra att öppna och innehållet är gelaktigt och kan sätta igen den enterala infarten.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Vankomycin (registrerad produkt)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Denna instruktion lämpar sig för barn som kan svälja kapslar och väger över 12,5 kg.

Peroralt vankomycin bör användas restriktivt pga risk för resistensutveckling mot vankomycin.

Enterokolit orsakad av stafylokokker

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 4, max 2 gram/DYGN

Behandlingstid: 10 dagar

Diarré orsakad av clostridium difficile (CDI)

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 4, max 2 gram/DYGN

Behandlingstid: 10 dagar

I produktresumén anges lägre dos vid icke-allvarlig CDI för barn över 12 år, i internationell barnlitteratur anges främst dosen ovan.

ÖVRIG INFORMATION

Det sker normalt ingen absorption av vankomycin i tarmen. Absorptionen kan dock vara förhöjd hos patienter med inflammerad tarm.



Vankomycin oralt

(ex Vancocin) kapslar



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID McDonald LC et al. Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile Infection in Adults and Children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA).

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462280>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4985

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-04-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT