



Remdesivir intravenös inf

(Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av pulver till infusionskoncentrat 5 mg/mL i fast volym spädningsvätska.

STEG 1: lös upp pulvret

STEG 2: späd vidare fast dos av koncentrat till slutvolym 100 mL

STAMLÖSNING

Ska spädas vidare

Remdesivir		Sterilt Vatten		SKA SPÄDAS VIDARE
100 mg				5 mg/mL
1 st	+	19 mL	=	20 mL

Beredningsinstruktion:

STEG 1: Låt ampullen med pulvret anta rumstemperatur. Tillför det sterila vattnet och skaka ampullen i 30 sek. Låt sedan ampullen stå i 2 - 3 min, det ska då bli en klar lösning. Om lösningen inte är klar upprepas proceduren (skaka 30 sek, låta stå i 2 - 3 min) tills lösningen är klar.

STEG 2: Använd infusionspåse/flaska innehållande 100 mL NaCl 9 mg/mL. Dra ut den volym NaCl som motsvarar volym remdesivir som ska tillsättas. Slutvolymen ska bli 100 mL.

Dos	Volym NaCl att dra ut	Volym remdesivir som tillsätts
100 mg	20 mL	20 mL (1 ampull)
200 mg	40 mL	40 mL (2 ampuller)

Vänd påsen/flaskan ungefär 20 gånger för att blanda lösningen ordentligt. Skaka inte.

ADMINISTRERING

Intravenös infusion: 30 - 120 min

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska endast ges till ineliggande patienter som kan övervakas noggrant.

COVID-19 med lunginflammation och som kräver extra syrgastillskott

Barn 12 - 18 år, och från 40 kg:

Dag 1: 200 mg x 1

Från dag 2: 100 mg x 1

Överväg att avsluta behandlingen om ingen förbättring ses efter 48 tim.

Behandlingstid: minst 5 dagar men inte mer än 10 dagar

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-11-02

ePedID: 4987

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-11-09

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-11-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Remdesivir intravenös inf

(Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Remdesivir (registrerad produkt)

100 mg, Pulver till infusionsvätska, lösning

Förvaras i kylskåp.

5 mg/mL, Stamlösning

Sparas ej, dosen tillsätts till spädningsvätska.

Remdesivir färdigblandad infusionslösning (från registrerad produkt)

1 st, Infusionsvätska, lösning

Färdigspädd lösning är hållbar 12 tim i rumstemperatur eller 24 tim i kylskåp.