



Klorokinfosfat oralt

tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 160 mg och 250 mg
160 mg klorokinFOSFAT motsvarar 100 mg klorokinBAS.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletten kan delas för att underlätta nedsväljning, men ej för att ge halv dos.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klorokinfosfat (registrerad produkt)

160 mg, Filmdragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax mot malaria

Doseras en gång per vecka
Barn 1 mån - 18 år: 8 mg klorokinFOSFAT/kg

Behandling bör börja senast ankomstdagen till område med malaria och fortsätta i 4 veckor efter avresa från det området.

Behandling av malaria

Dos i klorokinBAS:
Dos 1: 10 mg/kg
Dos 2: 5 mg/kg, 6 tim efter dos 1
Dos 3: 5 mg/kg, 18 tim efter dos 2
Dos 4: 5 mg/kg, 24 tim efter dos 3

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-06-01

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-06-02

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4988

Versionsnummer, major: 2

Giltig fr o m: 2020-06-02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT