



Hydroxiklorokin oralt 200 mg

(ex Plaquenil) tablett

Kan förlänga QT-intervallet, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 200 mg (Plaquenil, Pimaxiro)

ARBETSMILJÖ

Möjlig risk för fosterskador, hantera enligt lokal rutin. Krossning av tablett bör inte göras av gravida.

ADMINISTRERING

Tas under eller direkt efter måltid. Både Plaquenil och Pimaxiro saknar brytskåra.

Oralt:

Vid sväljsvårigheter kan tablett krossas och slammas upp i vatten eller blandas med mjuk mat i direkt anslutning till administreringen. Krossad tablett har mycket bitter smak.

Enteralt:

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. Krossningen bör göras noggrant, annars kan bitar av drageringen orsaka stopp.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Hydroxiklorokin (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda preparaten.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Juvenil systemisk lupus erytematosus (JSLE)

Ordineras i samråd med barnreumatolog

Barn: 5 - 6 mg/kg x 1, max 400 mg/DOS

Tabletterna är inte delbara. Till mindre barn får därför en veckodos räknas ut som sedan fördelas över veckodagarna.

Ögonkontroll bör genomföras vid behandlingsstart samt efter ca 5 års behandling för att utesluta retinala förändringar och bedöma synskärpa och färgseende.

ÖVRIG INFORMATION

Hydroxiklorokin kan ge QT-förlängning, vilket ökar risken för t.ex. torsade de pointes. Förlängningen är dosberoende och hydroxiklorokin ska ges med försiktighet till patienter med andra riskfaktorer för QT-förlängning (ex andra QT-förlängande läkemedel).

Hydroxiklorokin kan ge upphov till svår hypoglykemi.





Hydroxiklorokin oralt 200 mg (ex Plaquenil) tablett

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Internetadress Svensk Reumatologisk Förening - Ögonkontroller vid behandling med klorokinpreparat

<https://riktlinjer.svenskreumatologi.se/riktlinjer-och-rekommendationer/ogonkontroller-vid-behandling-med-klorokinpreparat/>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) Pimaxiro

https://docetp.mpa.se/LMF/Pimaxiro%20film-coated%20tablet%20SmPC_09001bee841c6bdf.pdf

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnreumatologisk Förening - Juvenil systemisk lupus erytematosus (jSLE), nationellt vårdprogram

<https://reuma.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa Akkawi El-Edelbi

ePedID: 4989

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-02-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT