



Medicinskt kol oralt 150 mg/mL

(Kolsuspension) oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kolsuspension, oral suspension 150 mg/mL.

För iordningställande och dosering av Carbomix, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt: Kolet kan, om det behövs, blandas med en liten mängd saft eller socker för att få en tilltalande smak. Till små barn kan pipmugg underlätta administrering.

Enteralt: för sondanslutning klipps toppen på "munstycket" av.

Om ventrikelsköljning utförs ges kol i sond efter utförd ventrikelsköljning.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Kolsuspension (registrerad produkt)

150 mg/mL, Oral suspension

Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad flaska ska kasseras efter första uttag.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling sker i samråd med Giftinformationscentralen, tel: 010-456 67 19.

Kol får endast ges till medvetandesänkt patient om luftvägen är säkrad (patienten är intuberad) för att undvika risken för aspiration.

Flera faktorer behöver beaktas vid beslut om att ge kol eller avstå, bland annat förgiftningsmedel, allvarlighetsgrad av förgiftning samt tidsfaktorn. Generellt är det aktuellt att ge kol upp till 1 timme efter intag av flytande beredningar och upp till 2 timmar efter tablettintag. Vid intag av depottabletter kan ytterligare en dos ges ca 2 timmar efter den första dosen.

Akuta förgiftningar

Barn 1 mån - 10 år: 10 - 20 gram (ca 70 - 140 mL)

Barn 11 - 18 år och vuxna: 25 - 50 gram (ca 170 - 340 mL)

Vid administrering i hemmet ges den lägre dosen.

Upprepat kol vid enterohepatisk recirkulation

Barn 1 mån - 10 år: 5 - 10 gram (ca 35 - 70 mL) x 6

Barn 10 - 18 år och vuxna: 25 gram (ca 170 mL) x 6

ÖVRIG INFORMATION

Medicinskt kol är olämpligt att ge efter intag av frätande ämnen och petroleumprodukter eftersom att risken för kräkning då ökar. Kolet försvårar även vid endoskopering av matstrupe och magsäck.

Kol binder dåligt till och används därför inte vid följande förgiftningar: litium, järn, kalium.





Medicinskt kol oralt 150 mg/mL

(Kolsuspension) oral suspension

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Giftinformationscentralen - Medicinskt kol

<https://giftinformation.se/lakare/initiala-atgarder/medicinskt-kol/>

PubMed PMID Cochrane Syst Rev Chiew et al Interventions for paracetamol (acetaminophen) overdose

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29473717>

PubMed PMID Juurlink DN. Activated charcoal for acute overdose: a reappraisal. Br J Clin Pharmacol. 2016 Mar;81(3):482-7.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26409027>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 4995

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-05-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT