



Amilorid oralt 5 mg

(ex Midamor licens) tablett

ADMINISTRERING

Oralt: Vid sväljsvårigheter kan tablettens krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering.

Entertalt: Tablettens krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering. Tablettens löslighet varierar dock beroende på fabrikat, vilket medför risk för stopp i sonden.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Amilorid (licensprodukt)

5 mg, Tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackning. Ljuskänsligt och fukt känsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kaliumsparande diuretika vid hypertoni, tilläggsbehandling

Barn 1 - 18 år: Startdos 0,4 - 0,6 mg/kg x 1, max 20 mg/DYGN

Viktigt att följa kaliumkoncentration och kreatinin, särskilt vid nyinsättning och dosökning.

REFERENS/LÄNK

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

PubMed PMID Indomethacin, Amiloride, or Eplerenone for Treating Hypokalemia in Gitelman Syndrome

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25012174>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) Amiloride 5 mg tablets, UK

Summary of Product Characteristics (SPC) Midamore 5 mg tablets

www.rxlist.com/midamor-drug.htm

Summary of Product Characteristics (SPC) Modamide 5 mg comprimé, FR

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4997

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-08-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT