



## Sukros oralt 240 mg/mL = 24 %

(Algopedol-Sucrose) oral vätska

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Medicinteknisk produkt Algopedol-Sucrose 24 %

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Droppas i munnen. Använd tröstnapp eller annan oral stimulering.

Ge, om möjligt, halva dosen cirka 1 - 2 min före ingreppet. Ge resterande mängd uppdelat på flera fraktioner för bäst effekt.

Får administreras av vårdnadshavare eller assistent.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Algopedol-Sucrose (medicinteknisk produkt)

24 %, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Efter första uttag kan behållaren användas igen till samma patient inom 8 timmar.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Procedursmärtä

Nyfödda (prematurfödda):

Vikt under 1,5 kg: 0,2 mL

Vikt 1,5 - 2 kg: 0,3 mL

Vikt över 2 - 2,5 kg: 0,5 mL

Vikt över 2,5 - 3 kg: 1 mL

Får ges max 4 gånger per dygn.

Nyfödda (fullgångna), från 3 kg: 2 mL, max 6 - 8 gånger per dygn

Ge, om möjligt, halva dosen cirka 1 - 2 min före ingreppet.

Ge resterande mängd uppdelat på flera fraktioner för bäst effekt.

### ÖVRIG INFORMATION

Algopedol-Sucrose finns i 2 mL-behållare.

Sukros är en sammansatt sockerart bestående av glukos och fruktos.

### REFERENS/LÄNK

Internetadress ALGOPEDOL Sucrose 24 % oral solution for Paediatric Use (Leaflet)

<https://www.inspiration-healthcare.com/downloads/instructions-for-use--158.pdf>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

[www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur](http://www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur)

Rekommendation (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Sockerlösning mot smärta vid injektioner och provtagning på spädbarn

[https://www.sbu.se/2012\\_08](https://www.sbu.se/2012_08)

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnsmärtförening - Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden

<https://svenskbarnsmartforening.se/nyfoddhetssmarta/>



## Sukros oralt 240 mg/mL = 24 % (Algopedol-Sucrose) oral vätska



### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-10-26

ePedID: 4998

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-29

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-10-29

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**