



Granisetron oralt

tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 1 och 2 mg

ADMINISTRERING

Första dosen ges en timme innan påbörjad cytostatikabehandling.
Tabletterna har ingen brytskåra och bör inte delas då dosnoggrannheten blir osäker.

Tabletterna kan slammas upp för att underlätta nedsväljning. Tabletterna läggs då med fördel i en oral spruta, dra sedan upp så liten mängd vatten som möjligt och skaka väl. Läkemedlet löser upp sig efter cirka 5 min.

Oralt

Enteralt: Lös upp tabletterna i en oral spruta enligt ovan och administrera i sond med storlek från 8 Fr.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Granisetron (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur, i originalförpackningen, ljuskänsligt. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Tabletterna har ingen brytskåra och bör inte delas då dosnoggrannheten blir osäker.

Cytostatikaorsakat illamående och kräkningar, profylax och behandling (låg evidens)

Låg och medelhög emetogen risk:

Barn: 40 MIKROG/kg x 2 = 0,04 mg/kg x 2

ÖVRIG INFORMATION

För cytostatika som ger hög emetogen risk (tex Cisplatin) rekommenderas behandling med intravenöst granisetron eller intravenöst/oralt palonosetron, se annan instruktion.

Vid behov av behandling eller profylax med granisetron under två eller flera dagar i följd rekommenderas istället intravenöst palonosetron, se annan instruktion.

Granisetron är en specifik 5 HT₃- antagonist som blockerar specifika serotoninreceptorer i hjärnan och gastrointestinaltrakten och ger ofta huvudvärk och förstoppning som biverkan.

Ingen maxdos finns studerad för den orala beredningsformen, för den intravenösa beredningsformen är maxdosen satt till 3 mg/DOS och 6 mg/DYGN.

Granisetron ska ges med försiktighet till patienter med bradykardi eller till patienter som använder andra QT-förlängande läkemedel t ex. amitriptylin.





Granisetron oralt tabletter

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Crediblemeds QT Drugs Lists

<https://www.crediblemeds.org/>

PubMed PMID Dupuis LL et al. Pediatric Oncology Group of Ontario. Guideline for the prevention of acute nausea and vomiting due to antineoplastic medication in pediatric cancer patients. *Pediatr Blood Cancer*. 2013.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23512831>

PubMed PMID Phillips RS et al. Antiemetic medication for prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in childhood. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 Feb.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26836199>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delförening för Pediatrisk Hematologi och Onkologi - Profylax mot illamående och kräkningar (CINV-profylax)

<https://pho.barnlakarforeningen.se/vardprogram-pho/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa Akkawi El-Edelbi

ePedID: 5011

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-03-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT