



## Isoniazid oralt 20 mg/mL

(Extempore) oral lösning

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Isoniazid APL oral lösning 20 mg/mL (extempore)

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Ska intas på fastande mage, minst 1 tim före måltid eller 2 tim efter.

Oralt

Enteralt i sond

### RIMLIG DOS för Isoniazid oralt 20 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	-	-	-	12,5 mL
10 mg/kg	-	2,5 mL	5 mL	-

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Isoniazid (extempore)

20 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Flaskan är hållbar 2 mån oavsett om den är öppnad eller inte.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ges i kombination med andra tuberkulosläkemedel vid aktiv sjukdom samt vid viss behandling av latent tuberkulos.

#### Tuberkulos

Nyfödda: (7 -) 10 (- 15) mg/kg x 1

Barn upp till 25 kg: (7 -) 10 (- 15) mg/kg x 1, max 300 mg x 1

Barn över 25 kg: 5 mg/kg x 1, max 300 mg x 1

Behandlingstid:

Aktiv tuberkulos: vanligen 6 mån

Latent tuberkulos, endast isoniazid: 6 - 9 mån

Latent tuberkulos, kombination med rifampicin: 3 - 4 mån

Kongenital tuberkulos, profylax: vanligen 3 - 4 mån

#### Tuberkulös meningit

Nyfödda: 10 - 20 mg/kg x 1

Barn upp till 25 kg: 10 - 20 mg/kg x 1, max 500 mg x 1

Barn över 25 kg: 5 mg/kg x 1, max 300 mg x 1

Behandlingstid: 12 mån

### ÖVRIG INFORMATION

Som profylax mot isoniazid-inducerad neuropati ges pyridoxin.





## Isoniazid oralt 20 mg/mL (Extempore) oral lösning

### REFERENS/LÄNK

APL databas (AIDA)

<https://www.apl.se>

Bok Starke J R et al. 2016. Handbook of Child & Adolescent Tuberculosis. Oxford University Press Inc. Första upplagan.

Internetadress WHO - Guidelines on tuberculosis

<https://www.who.int/publications/guidelines/tuberculosis/en/>

Internetadress Vårdprogram CNS-infektioner, bakteriella

<https://infektion.net/varprogram/cns-infektioner-bakteriella/>

PubMed PMID B D Daniel et al. Tuberculous meningitis in children: Clinical management & outcome

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31670267>

Rekommendation , (Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#5019](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5019)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-10-27

ePedID: 5019

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-10

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-11-10

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**