



## Kaptopril oralt 5 mg/mL

(ex Noyada licens) oral lösning

Vid dehydrering/hypovolemi bör ACE-hämmare tillfälligt sättas ut pga risk för förvärrad njursvikt och hyperkalemi.

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kaptopril APL oral lösning 5 mg/mL (extempore)  
Noyada oral lösning 25 mg/5 mL(licens)

Denna koncentration är mest lämplig för äldre barn. För yngre barn rekommenderas oral lösning 1 mg/mL, se annan instruktion.

### ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

### RIMLIG DOS för Kaptopril oralt 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,2 mg/kg	-	0,2 mL	0,4 mL	2 mL
1 mg/kg	-	1 mL	2 mL	10 mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Kaptopril APL (extempore)

5 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska är hållbar 28 dagar.

#### Noyada (licensprodukt)

25 mg/5mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Öppnad flaska är hållbar 21 dagar.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Försiktighet vid insättning och dosökning av kaptopril till nyfödda. Detta pga ökad risk för biverkningar (t.ex. njurpåverkan), särskilt vid doser över 2 mg/kg/dygn.

Viktigt att följa kaliumkoncentration och kreatinin, särskilt vid nyinsättning och dosökning.

#### Hypertoni

Nyfödda (begränsad evidens): Startdos 0,01 - 0,05 mg/kg x 3 - 4

Barn 1 - 2 mån: Startdos 0,01 - 0,05 mg/kg x 3 - 4

Barn 3 mån - 18 år: Startdos 0,1 - 0,2 mg/kg x 3

Dosen trappas upp långsamt.

Maxdos

Nyfödda och barn 1 - 2 mån: max 2 mg/kg/dygn

Barn 3 mån - 18 år: max 6 mg/kg/dygn, max 150 mg/dygn

Blodtrycket bör kontrolleras innan och efter administrerad dos vid insättning/dosökning. För nyfödda barn bör blodtrycket kontrolleras både 1 och 2 timmar efter administrerad dos.

#### Hjärtsvikt - "Afterload reduction"

Nyfödda (begränsad evidens): Startdos (0,01 -) 0,05 mg/kg

Måldos 0,5 - 1 mg/kg x 3

Maxdos 2 mg/kg/dygn

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 0,1 mg/kg

Måldos 0,5 - 1 mg/kg x 3

Max 6 mg/kg/dygn, max 150 mg/dygn

Dosen trappas upp långsamt.

Blodtryck och puls tas 1 timme före och efter 2 timmar vid insättning/dosökning.





## Kaptopril oralt 5 mg/mL

(ex Noyada licens) oral lösning

### ÖVRIG INFORMATION

ACE-hämmare (t.ex. kaptopril) är kontraindicerade under graviditet och njurskadande på fostret sent i graviditeten. Det finns en ökad risk för njurskada om läkemedlet ges till prematurfödda barn.

Att fortsätta RAAS-blockad (renin-angiotensin-aldosteron-system-blockad) är värdefullt även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Dionne JM et al. Hypertension in infancy: diagnosis, management and outcome

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21258818>

PubMed PMID Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28827377>

PubMed PMID Starr MC and Flynn JT. Neonatal hypertension: cases, causes, and clinical approach

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29808264>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Summary of Product Characteristics (SPC) Noyada 25mg/5mL Oral Solution

<https://www.medicines.org.uk/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#5032](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5032)



# Kaptopril oralt 5 mg/mL

(ex Noyada licens) oral lösning



## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani 2021-09-20  
Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-09-20  
Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

ePedID: 5032  
Versionsnummer, major: 3  
Giltig fr o m: 2021-09-20

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**