



Nirsevimab intramuskulär inj 100 mg/mL

(Beyfortus)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Förfylld spruta 50 mg (0,5 mL, lila kolvstång)

Förfylld spruta 100 mg (1 mL, ljusblå kolvstång)

INGEN SPÄDNING

IM INJ

100 mg/mL

0,5 mL alt 1 mL

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion: Administrering i den främre, yttre delen av låret rekommenderas.

Lösningen ska vara klar till grumligt vit, färglös till gul.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Nirsevimab (registrerad produkt)

100 mg/mL, Injektionsvätska, intramuskulär

Förvaras i kylskåp i ytterförpackningen, ljuskänsligt. Får ej frysas. Får ej skakas eller utsättas för direkt värme. Sprutan kan förvaras i rumstemperatur i max 8 tim om den skyddas mot ljus. Om längre tid passerar ska sprutan kasseras.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax mot allvarlig RSV-infektion för barn i risknivå 1 enl. FOHM (se Övrig information och Referens)

Nirsevimab ska ges till nyfödda och spädbarn under deras första RSV-säsong. Administrering sker innan RSV-säsongen börjar eller från födseln för de barn som föds under säsongen.

Nyfödda och barn under 5 kg: engångsdos 50 mg (0,5 mL)
Barn från 5 kg, vanligen upp till 12 mån: engångsdos 100 mg (1 mL)

Patient som genomgår hjärtkirurgi med kardiopulmonell bypass kan ges ytterligare en dos efter operationen, så snart tillståndet tillåter. Detta för att säkerställa tillräcklig serumnivå av nirsevimab. Om den extra dosen ges inom 90 dagar efter den första dosen ska dosen vara utifrån kroppsvikt enligt ovan. Om mer än 90 dagar gått sedan första dosen ska den extra dosen vara 50 mg oavsett kroppsvikt.

ÖVRIG INFORMATION

Nirsevimab kan ges vid samma tillfälle som rutinmässiga barnvacciner. Vid samtidig administrering av injektionsvaccin ska injektionerna ges på olika ställen.

NT-rådet rekommenderar (2023-11-17) att Beyfortus i nuläget endast bör användas för prevention av RSV-infektion för barn i risknivå 1, enligt Folkhälsomyndighetens definition av riskgrupper för allvarlig RSV-infektion.





Nirsevimab intramuskulär inj 100 mg/mL

(Beyfortus)

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - RS-virus: Riskgrupper och rekommendationer om förebyggande insatser

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/rs-virus-riskgrupper-och-rekommendationer-om-forebyggande-insatser/>

janusinfo.org NT-rådets rekommendation: Beyfortus för prevention av sjukdom orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

<https://janusinfo.se/download/18.35b8622618bcc35b4ee36641/1700221676753/Beyfortus%202023-11-17.pdf>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Handläggning av RSV-infektioner inkl särskild rekommendation för säsong 2023/2024

www.lakemedelsverket.se/rsv

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén

ePedID: 5036

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-12-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT