



# Naloxon nasalt 1,8 mg

(Nyxoid)

## INGEN SPÄDNING

NÄSSPRAY  
**1,8 mg**  
1 st

## ADMINISTRERING

I första hand ges naloxon intravenöst eller intramuskulärt, se annan instruktion.  
I vissa fall, t ex då infart saknas, är det mer lämpligt med nasal administrering.

Nasalt:

Tryck bestämt på kolven tills den klickar till för att ge dosen.

Varje spraybehållare innehåller endast en dos och får därför inte testas innan administrering.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

**Nyxoid (registrerad produkt)**

1,8 mg, Nässpray, lösning

Får ej frysas.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid behov ring Giftinformationscentralen 010 - 456 67 19.

### Misstänkt akut opioidförgiftning, diagnostik och behandling

Barn 14 - 18 år och vuxna: 1,8 mg som engångsdos (ges i en näsborre)

Avsikten med behandlingen är att bryta den andningsdeprimerande effekten.

Om patienten inte svarar på en dos, kan ytterligare en dos ges efter

2 - 3 minuter, i den andra näsborren.

Om patienten svarar på första dosen, men åter får andningsdepression ska en andra dos ges omedelbart.

Vid utebliven effekt ska annan orsak till symtomen övervägas.

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Malmros Olsson E et al. Rapid systemic uptake of naloxone after intranasal administration in children. Paediatr Anaesth. 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33687794>

PubMed PMID Vanky E et al. Pharmacokinetics after a single dose of naloxone administered as a nasal spray in healthy volunteers. Acta Anaesthesiol Scand. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28444856>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 5068

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2026-02-18

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**