



Natriumoxibat oralt 500 mg/mL = 0,5 gram/mL

(ex Xyrem) oral lösning

Risk för andningsdepression.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Oral lösning 500 mg/mL (ex Xyrem)

Observera att ordinerad dos ska spädas med vatten före intag, se Administrering.

ADMINISTRERING

Den dagliga dosen delas upp på 2 doseringstillfällen. Första dosen ges vid sänggåendet och den andra ges 2,5 - 4 tim senare. Båda doserna kan iordningställas vid samma tidpunkt.

Varje dos ska SPÄDAS med 60 mL vatten före administrering pga att lösningen smakar salt. Andra vätskor än vatten ska inte användas då de kan påverka läkemedlets effekt.

Ska tas på fastande mage, dos 1 tas 2 - 3 timmar efter måltid. Det bör vara samma tidsskillnad mellan måltid och intag av dos varje gång.

Oralt

Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Natriumoxibat (registrerad produkt)

500 mg/mL, Oral lösning

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning hållbar 3 mån. Efter utspädning av ordinerad dos ska denna användas inom 24 tim.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att ordinerad dos ska spädas med vatten före intag, se Administrering.

Nattlig dyssomni vid narkolepsi med kataplexi

De två doserna per dag ges vid sänggåendet och 2,5 - 4 tim senare.

Barn från 7 år, minst 15 kg

15 - 19 kg:

Initialt max 0,5 gram x 2 i 1 - 2 veckor (max 1 mL x 2)

Därefter titrering av dosen till klinisk effekt. Dygnsdosen kan ökas med max 0,5 gram (1 mL) per vecka.

20 - 29 kg:

Initialt max 1 gram x 2 i 1 - 2 veckor (max 2 mL x 2)

Därefter titrering av dosen till klinisk effekt. Dygnsdosen kan ökas med max 1 gram (2 mL) per vecka.

30 - 44 kg:

Initialt max 1,5 gram x 2 i 1 - 2 veckor (max 3 mL x 2)

Därefter titrering av dosen till klinisk effekt. Dygnsdosen kan ökas med max 1 gram (2 mL) per vecka.

Från 45 kg:

Initialt max 2,25 gram x 2 i 1 - 2 veckor (max 4,5 mL x 2)

Därefter titrering av dosen till klinisk effekt. Dygnsdosen kan ökas med max 1,5 gram (3 mL) per vecka.

Maxdos

15 - 44 kg: 0,2 gram/kg/dygn

Från 45 kg: 9 gram/dygn



Natriumoxibat oralt 500 mg/mL = 0,5 gram/mL

(ex Xyrem) oral lösning

ÖVRIG INFORMATION

Natriumoxibat är en CNS-dämpande substans som kan orsaka andningsdepression och bör därför inte kombineras med andra läkemedel/ämnen som har samma effekt så som bensodiazepiner och alkohol.

Vid samtidig behandling med valproat (eller annan hämmare av GHB dehydrogenas) bör dosen natriumoxibat sänkas med 20 %.

Natriumoxibat är natriumsaltet av GHB (gamma-hydroxibutansyra) och risk för missbruk finns.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress 1177 för vårdpersonal: Kunskapsstöd, Nervsystem och smärta - Narkolepsi, riktlinje för behandling av barn och vuxna

<https://vardpersonal.1177.se/kunskapsstod/nervsystem-och-smarta/>

Micromedex

Produktinformation Xyrem oral solution

<https://www.xyremhcp.com/>

PubMed PMID Franceschini C et al. A practical guide to the pharmacological and behavioral therapy of Narcolepsy. Neurotherapeutics 2021.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33886090>

PubMed PMID Lecendreux M et al. Long-term safety and maintenance of efficacy of sodium oxybate in the treatment of narcolepsy with cataplexy in pediatric patients. J Clin Sleep Med. 2022

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35689598>

PubMed PMID Moresco M et al. Sodium oxybate treatment in pediatric type 1 narcolepsy. Curr Drug Metab. 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29512449>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>





Natriumoxibat oralt 500 mg/mL = 0,5 gram/mL

(ex Xyrem) oral lösning

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5091

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-08-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT