



Glukos intravenös inf 150 mg/mL

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Glukos 150 mg/mL (extempore, beställs i 500 mL glasflaskor).
Om dessa saknas kan iordningställande ske enligt:

Tillsatser som ger Glukos intravenös inf 150 mg/mL

Alt 1: Slutvolym 50 mL

| | |
|------------------|-------|
| Glukos 100 mg/mL | 25 mL |
| Glukos 200 mg/mL | 25 mL |

Tillsatser som ger Glukos intravenös inf 150 mg/mL

Alt 2: Slutvolym 500 mL

| | |
|------------------|--------|
| Glukos 100 mg/mL | 250 mL |
| Glukos 200 mg/mL | 250 mL |

Tillsatser som ger Glukos intravenös inf 150 mg/mL

Alt 3: Slutvolym 1000 mL

| | |
|------------------|--------|
| Glukos 100 mg/mL | 500 mL |
| Glukos 200 mg/mL | 500 mL |

ADMINISTRERING

Intravenös infusion: helst i central infart.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Glukos (registrerad produkt)

200 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Efter första uttag för blandning för intravenöst bruk kasseras lösningen direkt.

100 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Efter första uttag för blandning för intravenöst bruk kasseras lösningen direkt.

150 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypoglykemi hos nyfödda

Denna koncentration kan övervägas som glukosinfusion vid hypoglykemi om vätskemängden blir för stor med svagare glukoslösningar.

För dos och upptrappning se nationellt vårdprogram, dock är inte denna glukoskoncentration med i tabellen utan beräkning får ske på egen hand.

Intravenös tillförsel av vätska hos nyfödda

Enligt lokal riktlinje

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Rekommendation , (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Hypoglykemi vårdprogram

<http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5114

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-10-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT