



Glukos intravenös inf 150 mg/mL

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

- Alt. 1: Glukos 150 mg/mL (extempore, finns i 100 mL och 500 mL glasflaskor).
Alt. 2 - 4: Om extempore inte är tillgängligt kan iordningställande ske enligt nedan:

INGEN SPÄDNING

Alt 1

INF
150 mg/mL
flera volymer finns

Tillsatser som ger Glukos intravenös inf 150 mg/mL

Alt 2: Slutvolym 50 mL

Glukos 100 mg/mL	25 mL
Glukos 200 mg/mL	25 mL

Tillsatser som ger Glukos intravenös inf 150 mg/mL

Alt 3: Slutvolym 500 mL

Glukos 100 mg/mL	250 mL
Glukos 200 mg/mL	250 mL

Tillsatser som ger Glukos intravenös inf 150 mg/mL

Alt 4: Slutvolym 1000 mL

Glukos 100 mg/mL	500 mL
Glukos 200 mg/mL	500 mL

ADMINISTRERING

Intravenös infusion: helst i central infart.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypoglykemi hos nyfödda

Denna koncentration kan övervägas som glukosinfusion vid hypoglykemi om vätskemängden blir för stor med svagare glukoslösningar.

För dos och upptrappning se nationellt vårdprogram, dock är inte denna glukoskoncentration med i tabellen utan beräkning får ske på egen hand.

Intravenös tillförsel av vätska hos nyfödda

Enligt lokal riktlinje

REFERENS/LÄNK

ePed Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Hypoglykemi vårdprogram

<http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5114

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-08-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Glukos intravenös inf 150 mg/mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Glukos (registrerad produkt)

200 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Efter första uttag för blandning för intravenöst bruk kasseras resterande lösning.

100 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Efter första uttag för blandning för intravenöst bruk kasseras resterande lösning.

150 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Efter iordningställande: hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.