



Immunglobulin subkutan inf/inj 200 mg/mL

(ex Cuvitru)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Humant, normalt immunglobulin (HNIG/SCIG) 200 mg/mL (Cuvitru, Hizentra, Xembify)

INGEN SPÄDNING

SUBKUTAN INF INJ
200 mg/mL
 flera volymer finns

ADMINISTRERING

Xembify ska anta rumstemperatur innan administrering.

Subkutan infusion:

Fler än ett infusionsställe kan användas samtidigt. Vanlig rekommenderad initial infusionshastighet är 10 mL/tim/infusionsställe. Därefter justering av infusionshastighet och volym/infusionsställe utifrån patientens tolerans. För barn är 5 - 15 mL vanlig volym/infusionsställe.

Subkutan injektion: ges långsamt, hastigheten styrs av volymen och eventuellt obehag hos patienten

Intramuskulär injektion: se Övrig information

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

RIMLIG DOS för Immunglobulin subkutan inf/inj 200 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mL/kg, max 15 mL	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	15 mL
100 mg/kg	-	2,5 mL	5 mL	25 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Substitutionsbehandling vid primär eller sekundär immunbrist

Ges som subkutan infusion.

Behandling initieras vanligen vid S-IgG under 4 gram/L och kliniskt behov. Dos och doseringsintervall styrs utifrån effekt och IgG-dalvärden över 6 - 8 (- 10 - 12) gram/L.

Barn 1 mån - 18 år: vanlig dos 100 mg/kg, ges vanligen EN gång/VECKA

Postexpositionsprofylax mot mässling

Ges som subkutan injektion alternativt intramuskulär injektion, se Övrig information.

Behandling med immunglobulin ges till patienter som:

- saknar skydd mot mässling och för vilka det är för sent för vaccinering
- vaccinering med levande försvagade vacciner är kontraindicerat

Nyfödda: 0,5 mL/kg (100 mg/kg)

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 mL/kg, max 15 mL (100 mg/kg, max 3 gram)

Immunglobulin bör ges inom 72 tim efter exponering och ska ges inom 6 dagar.

ÖVRIG INFORMATION

De produkter som denna instruktion gäller för har inte intramuskulär injektion angivet som administrerings sätt i produktresuméerna, men enligt vår farmaceutiska bedömning kan denna metod användas vid behov.

Den maximala volymen som kan administreras intramuskulärt på ett ställe varierar utifrån val av muskel samt ålder/storlek på patienten. Som riktmärke bör inte mer än 2 mL injiceras på ett ställe till barn och inte mer än 5 mL till ungdomar.





Immunglobulin subkutan inf/inj 200 mg/mL

(ex Cuvitru)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Cuvitru (registrerad produkt)

200 mg/mL, Injektion/infusionsvätska, subkutan

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förvara flaskan i ytterkartongen, ljuskänsligt. Öppnad flaska används direkt, sparas inte.

Hizentra (registrerad produkt)

200 mg/mL, Injektion/infusionsvätska, subkutan

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förvara flaska/spruta i ytterkartongen, ljuskänsligt. Öppnad flaska/spruta används direkt, sparas inte.

Xembify (registrerad produkt)

200 mg/mL, Injektion/infusionsvätska, subkutan

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvara flaskan i ytterkartongen, ljuskänsligt. Kan förvaras upp till 6 mån vid högst 25 °C. Om läkemedlet har förvarats i rumstemp en tid ska det inte sättas in i kylskåp igen. Öppnad flaska används direkt, sparas inte.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Smittskyddsläkarföreningen - Rekommendationer för användning av immunglobuliner som postespositionsprofylax mässling

<https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2024/02/rekommendationer-for-anvandning-av-immunglobuliner-som-postexpositionspofylax.pdf>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Pediatrisk hematologi och onkologi - Immunbristsjukdomar, utredning enligt SLIPI

<https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/vph-wardplaneringsgruppen-for-pediatrik-hematologi/wardprogram-vph/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5115

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5115

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-11-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT