



## cefIXim oralt

(ex Suprax licens) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Filmdragerad tablett 200 mg (ex Cefixim STADA, licens)

Filmdragerad tablett 400 mg (ex Suprax, licens)

Cefixim finns även som oral suspension 20 mg/mL (licens), se annan instruktion.

### ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner.

### ADMINISTRERING

Oralt:

Tablett 400 mg har brytskåra och kan delas i två lika stora doser, gäller dock inte Suprax Astellas.

Enteralt:

Användning av oral suspension rekommenderas, se annan instruktion.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Cefixim (licensprodukt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna och alla fabrikat.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Urinvägsinfektion, vid misstänkt njurengagemang eller oklar nivå

Nyfödda: 8 mg/kg x 1 (låg evidens, se Övrig information)

Barn 1 mån - 12 år, eller under 50 kg: 8 mg/kg x 1

Barn över 12 år, eller från 50 kg: 400 mg x 1

Alternativt kan dygnsdosen delas upp på två doseringstillfällen.

Behandlingstid:

Nyfödda och barn under 2 år: 10 dagar

Barn från 2 år, utan njurengagemang: 5 dagar

Barn från 2 år, med njurengagemang: 10 dagar

### ÖVRIG INFORMATION

Det finns inte mycket beskrivet i litteraturen angående användning av cefixim till nyfödda, men det finns heller inte något som talar emot då användning av andra cefalosporiner är väldokumenterad för denna patientgrupp.



## cefIXim oralt (ex Suprax licens) tabletter



### REFERENS/LÄNK

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Övriga läkemedel, ej registrerade

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/ovriga-ej-registrerade/>

Internetadress Strama - Brist på ceftibuten - cefixim alternativ terapi vid febril urinvägsinfektion

<https://strama.se/nyheter/brist-pa-ceftibuten/>

PubMed PMID Bocquet N et al. Randomized trial of oral versus sequential IV/oral antibiotic for acute pyelonephritis in children.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22291112>

PubMed PMID Darmstadt GL et al. Oral antibiotics in the management of serious neonatal bacterial infections in developing country communities.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19106761>

PubMed PMID Kresken M et al. Comparative in vitro activity of oral antimicrobial agents against Enterobacteriaceae from patients with community-acquired urinary tract infections in three European countries.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26321667>

PubMed PMID Robinson JL et al. Urinary tract infections in infants and children: Diagnosis and management.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25332662>

PubMed PMID Stein R et al. Urinary tract infections in children: EAU/ESPU guidelines

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25477258>

PubMed PMID Strohmeier Y et al. Antibiotics for acute pyelonephritis in children.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25066627>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) Cefixim STADA

[https://www.stada.de/media/d10gapg5/cefixim\\_stada\\_200\\_400\\_mg\\_filmtabletten\\_202101\\_veroff20210315.pdf](https://www.stada.de/media/d10gapg5/cefixim_stada_200_400_mg_filmtabletten_202101_veroff20210315.pdf)

Summary of Product Characteristics (SPC) Suprax (Odan Laboratories Ltd)

<https://www.janusinfo.se/nyheter/nyheter/2021/kommandebristpaceftibuten.html>

### EPED CENTRAL

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5129

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-04-24

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**