



Isoprenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL

(ex Isoprenaline)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Registrerad produkt: Isoprenaline Macure Pharma 0,2 mg/mL.
 Licensprodukt, endast vid restsituation: Isuprel 0,2 mg/mL,
 Isoprenalina Cloridrato S.A.L.F. 0,2 mg/mL och Isoprenalina Cloridrato Monico 0,2 mg/mL.

EN-STEGSSPÄDNING

Isoprenalin		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50	INF
0,2 mg/mL	+	mg/mL	= 20 mikrog/mL
5 mL		45 mL	50 mL

Beredningsinstruktion:

Koncentratlösningen till infusionsvätska är klar och färglös eller svagt gul.

ADMINISTRERING

Intravenös infusion (kontinuerlig): detta läkemedel får inte administreras med andra läkemedel.

RIMLIG DOS för Isoprenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,01 mikrog/kg/min	0,03 mL/tim	0,15 mL/tim	0,3 mL/tim	1,5 mL/tim
0,5 mikrog/kg/min	1,5 mL/tim	7,5 mL/tim	15 mL/tim	75 mL/tim

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Isoprenalin (registrerad produkt)

0,2 mg/mL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
 obruten ampull förvaras i kylskåp. Bruten ampull får ej sparas, används direkt.
 20 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning
 Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandlingen kräver EKG-övervakning.

Hjärtblock II-III, svår bradykardi

Nyfödda: 0,01 - 0,5 (- 1 - 2) mikrog/kg/min. Starta med låg initial dos.

Barn 1 mån - 18 år: 0,01 - 0,5 (- 1 - 2) mikrog/kg/min. Starta med låg initial dos.

ÖVRIG INFORMATION

Används med försiktighet vid hypertoni, diabetes och/eller hypertyreos.

Förvarningsanvisning skiljer sig för de olika licensprodukterna, se bipacksedeln/SPC för den specifika produkten. Bruten ampull får ej sparas, används direkt.

Isoprenaline Macure Pharma innehåller 16 mg natrium per ampull à 5 mL.

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Isoprenaline Macure Pharma

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=2019013000064>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani 2021-11-18

ePedID: 5139

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2021-11-24

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-11-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT