



Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 10 mikrog/dos

mot covid-19, barn 5 - 11 år

Ska spädas innan administrering.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av koncentrat till injektionsvätska, dispersion 10 mikrog/dos (Comirnaty, orange lock)

Till äldre barn ska Comirnaty 30 mikrog/dos (lila alt. grått lock) användas, se annan instruktion.

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 1 Comirnaty 10 mikrog/dos, orange lock

Comirnaty 10 mikrog/dos	NaCl 9 mg/mL		IM INJ
1 flaska			10 mikrog/dos
1,3 mL	+		
		=	2,6 mL

Beredningsinstruktion:

INNAN SPÄDNING: Låt flaskan anta rumstemperatur. Vänd flaskan försiktigt 10 gånger, skaka inte (se Övrig information). Flaskan ska skyddas från direkt solljus. Lösningen kan innehålla vita till benvita ogenomskinliga partiklar.

SPÄDNING: Dra upp 1,3 mL NaCl 9 mg/mL och tillsätt detta försiktigt till flaskan med hjälp av en 21 G eller tunnare nål. Viktigt - efter avslutad tillsats, håll nålen ovanför vätskeytan och dra upp 1,3 mL luft i sprutan för att tryckutjämna och därmed undvika att vaccin läcker ut när nålen tas bort. Vänd flaskan försiktigt 10 gånger, skaka inte. Vaccinet ska nu vara vitt till benvitt utan synliga partiklar. Om så inte är fallet ska flaskan kasseras. Märk flaskan med datum och tidpunkt för spädningen.

ORDNINGSTÄLLANDE AV DOS: Dra försiktigt upp 0,2 mL. Om spruta och/eller nål med låg dödvolym används (max 35 mikroliter) kan 10 doser erhållas ur en flaska. Om kvarvarande volym inte räcker till en full dos på 0,2 mL ska den resterande volymen kasseras. Vaccin från olika flaskor ska inte blandas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax mot covid-19-infektion

Barn 5 - 11 år: 0,2 mL/DOS

För antal doser och tidsintervall mellan doserna följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regionala/lokala beslut.

ÖVRIG INFORMATION

Comirnaty är ett nukleosid-modifierat mRNA-fragment som kodar för SARS-CoV-2 spike-proteinet.

Den aktiva substansen i vaccinet är inkapslad i en lipiddroppe och är därför känslig för skakningar.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccination mot covid-19

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/>

Internetadress Global information om Comirnaty

<https://www.comirnatyeducation.se/>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5160

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-09-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Vaccin: Comirnaty intramuskulär inj 10 mikrog/dos

mot covid-19, barn 5 - 11 år

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion:

Vaccinet ska anta rumstemperatur innan administrering. Rekommenderas att ges i deltoideusmuskeln i överarmen.

Risk för anafylaktisk reaktion, patienten bör observeras i minst 15 min efter given dos.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Comirnaty 10 mikrog/dos (registrerad produkt)

1 flaska, Koncentrat till injektionsvätska, dispersion

Djupfrost vaccin (-90 till -60 °C) är hållbart 12 mån. Inom denna tid kan vaccinet förvaras 10 veckor i kylskåp. Innan spädning kan öppnad flaska förvaras max 12 tim i rumstemp.

10 mikrog/dos, Injektionsvätska, intramuskulär

Färdigspädd lösning bör användas direkt, men ska användas inom 12 tim från spädningstillfället. Förvaras i 2 - 30 °C.