



Arginin oralt 100 mg/mL

(Extempore) oral vätska

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Oral vätska 100 mg/mL (extempore), går att beställa med eller utan smak.

Infusionsvätskan kan vid behov ges oralt.

ADMINISTRERING

Ska tas i samband med måltid.

Oralt

Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Arginin APL (extempore)

100 mg/mL, Oral vätska

Förvaras vid högst 25 °C. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

100 mg/mL, Injektion/infusionsvätska för oralt bruk

24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Metabol defekt i ureacykeln med hyperammonemi, underhållsbehandling

Ordineras i samråd med specialist i metabola sjukdomar

Doserna ska tas i samband med måltid.

Nyfödda: 100 - 300 mg/kg/DYGN, fördelat på 3 - 4 doser

Barn 1 mån - 18 år, vikt under 20 kg:

100 - 300 mg/kg/DYGN, fördelat på 3 - 4 doser

Barn 1 mån - 18 år, vikt från 20 kg:

2,5 - 6 mg/m²/DYGN, fördelat på 3 - 4 doser, max 6 gram/DYGN

ÖVRIG INFORMATION

Arginin kan stimulera frisättningen av insulin och glukagon, därför bör blodglukosnivåerna följas. Även blodtrycket bör följas då arginin är en prekursor till NO och kan orsaka hypotension och kräkning.

REFERENS/LÄNK

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Internetadress British Inherited Metabolic Disease Group - Formularies, Metabolic Formulary (medications)

<http://www.bimdg.org.uk/site/formularies.asp>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5173

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-08-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT