



## Fidaxomicin oralt 40 mg/mL

(Dificlir) oral suspension

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

- Alt. 1: Färdigspädd oral suspension 40 mg/mL (Dificlir)  
 Alt. 2: Granulat till oral suspension, späds på vårdenhet (Dificlir)

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver/granulat ska finnas för vårdenheten om alt. 2 används.

### INGEN SPÄDNING

Alt. 1 Färdigspädd från apotek

ORAL SUSP  
**40 mg/mL**  
 110 mL

### EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Fidaxomicin		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
	+		=	<b>40 mg/mL</b>
1 flaska		105 mL		110 mL

#### Beredningsinstruktion:

Skaka flaskan för att lösgöra granulatet. Tillsätt vattnet. Stäng flaskan och skaka kraftigt i minst 1 min. Upprepa skakningen om det finns klumpar av granulat kvar. Låt sedan flaskan stå 1 min och kontrollera att suspensionen är homogen. Suspensionen är vit till gulaktig.

Granulatet bidrar med volym, därför blir slutvolymen större än den tillsatta volymen sterilt vatten.

### ADMINISTRERING

Flaskan ska tas ut ur kylskåpet ca 15 minuter innan dosen ska administreras, skakas försiktigt.

Oralt

Enteralt

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Fidaxomicin bör i första hand användas till patienter med hög recidivrisk (dyrt läkemedel).

#### Tarminfektion orsakad av Clostridioides difficile (CDI)

Nyfödda: 16 mg/kg x 2  
 Barn 1 mån - 18 år: 16 mg/kg x 2, max 200 mg/DOS

Alternativt fast dosering enligt produktresumé:

Vikt under 4 kg:	40 mg x 2	(1 mL x 2)
Vikt 4 - 6 kg:	80 mg x 2	(2 mL x 2)
Vikt 7 - 8 kg:	120 mg x 2	(3 mL x 2)
Vikt 9 - 12 kg:	160 mg x 2	(4 mL x 2)
Vikt från 12,5 kg:	200 mg x 2	(5 mL x 2)

Behandlingstid: 10 dagar

### ÖVRIG INFORMATION

Fidaxomicin ska användas med försiktighet till patienter med känd allergi mot makrolider.





## Fidaxomicin oralt 40 mg/mL

(Dificlir) oral suspension

### RIMLIG DOS för Fidaxomicin oralt 40 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
16 mg/kg, max 200 mg	0,4 mL	2 mL	4 mL	5 mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Fidaxomicin (registrerad produkt)

Granulat till oral suspension

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen, ljuskänsligt.

40 mg/mL, Oral suspension

Efter beredning hållbar 27 dagar i kylskåp.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Micromedex

PubMed PMID Oliver MB, Vaughn BP. Fidaxomicin Use in the Pediatric Population with Clostridioides difficile. Clin Pharmacol. 2022

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36177387>

PubMed PMID Patel P et al. Guideline for the management of Clostridioides difficile infection in pediatric patients with cancer and hematopoietic cell transplantation recipients: 2024 update. EClinicalMedicine. 2024

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38680517>

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5191

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2025-03-12

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**