



Bupropion oralt

(ex Voxra) tabletter med modifierad frisättning

Risk för krampanfall, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter med modifierad frisättning 150 och 300 mg (ex Voxra)

ADMINISTRERING

Oralt: Bupropion bör intas på morgonen, då sömnsvårigheter är en mycket vanlig biverkning.

Tabletterna ska sväljas hela. Tabletterna ska inte delas, krossas eller tuggas eftersom det kan leda till ökad risk för biverkningar, inklusive krampanfall.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Bupropion (registrerad produkt)

Tablett med modifierad frisättning

Förvaras vid högst 25 °C. Vissa tillverkare anger att preparatet är fuktkänsligt samt ljuskänsligt och ska förvaras i originalförpackningen, se produktresumé. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Risk för allvarlig förgiftning vid överdosering, överväg att aktivt begränsa mängden tabletter patienten har tillgång till vid ett givet tillfälle, se Övrig information.

Kontrollerade studier på barn och ungdomar saknas, rekommendationerna bygger på erfarenhet från vuxna.

Tilläggsbehandling vid depression vid otillräcklig effekt av enbart SSRI

Barn 16 - 18 år:

Startdos: 150 mg x 1 på morgonen

Om ingen förbättring observeras efter 4 veckors behandling kan dosen ökas till 300 mg x 1 på morgonen.

Monoterapi vid depression

Vid utebliven respons efter behandling med två SSRI i adekvat dos kan i vissa fall monobehandling med bupropion ges.

Barn 16 - 18 år:

Startdos: 150 mg x 1 på morgonen

Om ingen förbättring observeras efter 4 veckors behandling kan dosen ökas till 300 mg x 1 på morgonen.

Utsättning

Bupropion bör trappas ut successivt. Planera utsättningen för att undvika eventuella återfall.

Förslag är att sänka dosen stegvis med 4 veckor på varje steg; från 300 mg dagligen till 150 mg dagligen och slutligen 150 mg varannan dag.





Bupropion oralt

(ex Voxra) tabletter med modifierad frisättning

ÖVRIG INFORMATION

Bupropion kan leda till allvarlig samt svårbehandlad förgiftning vid överdos, se referens. Överväg att aktivt begränsa mängden tabletter patienten har tillgång till vid ett givet tillfälle, exempelvis genom att förskriva mindre förpackning, använda expeditoinsintervall eller ange att endast vårdnadshavare får hämta ut läkemedlet.

Det finns dosberoende risk för krampanfall vid behandling med bupropion, därför ska den rekommenderade dosen inte överskridas.

Bupropion är kontraindicerat för patienter som har eller tidigare har fått diagnosen anorexia nervosa eller bulimi. Bupropion kan ge minskad aptit och viss viktnedgång. Patienter med bulimi kan även få ökad kramprisk pga elektrolytrubbningar.

Samtidig administrering av bupropion och serotonerga preparat som SSRI, SNRI samt TCA kan ge ökad risk för serotonergt syndrom. Överväg extra monitorering av tecken på serotonerga biverkningar vid samtidig behandling. MAO-hämmare i kombination med bupropion är kontraindicerat.

Då bupropion kan ge förhöjt blodtryck ska detta följas.

Överkänslighet mot bupropion kan yttra sig som influensaliknande symtom eller utslag.

En vanlig biverkning som kan uppstå vid insättning av bupropion är irritabilitet, vilket kan vara övergående. Detta försvinner vid utsättning.





Bupropion oralt

(ex Voxra) tabletter med modifierad frisättning

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Farmakainstruktion 2025 Kunskapsstöd för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling inom BUP Stockholm

<https://www.bup.se/om-oss/samarbeten-och-samverkan/for-dig-som-ar-vardgivare/>

Internetadress Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri - riktlinjer

<https://slf.se/sfbup/riktlinjer/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

<https://lv.se/depression-angest>

PubMed PMID Hallengren J et al. Livshotande tillstånd vid överdos av antidepressiva läkemedel [Poisonings with antidepressants]. Lakartidningen. 2025

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/40899919>

PubMed PMID Sheridan DC et al. Suicidal bupropion ingestions in adolescents: increased morbidity compared with other antidepressants. Clin Toxicol (Phila). 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28944696>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 5215

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-11-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT