



Lurasidon oralt

(Latuda) tabletter

Ökad suicidrisk efter insättning samt vid byte av behandling, se Övrig information.

Risk för extrapyramidala symtom, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 18,5; 37 och 74 mg (Latuda)

Styrkorna anger innehåll av lurasidon.

Vissa källor anger doser i lurasidonhydroklorid, 18,5 mg lurasidon motsvarar 20 mg lurasidonhydroklorid.

ADMINISTRERING

Oralt: Tabletterna har bitter smak och bör sväljas hela. Tas tillsammans med mat för att öka absorptionen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Lurasidon (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska förskrivas av specialist inom barnpsykiatri.

Doserna nedan avser lurasidon. Vissa källor anger doser i lurasidonhydroklorid, 18,5 mg lurasidon motsvarar 20 mg lurasidonhydroklorid.

Schizofreni

Barn 13 - 18 år:

Startdos 37 mg x 1. Vid behov kan dosen trappas upp till max 74 mg x 1.

Vid samtidig behandling med läkemedel som är måttliga CYP3A4-hämmare (t.ex. erytromycin och flukonazol), dosjustera enligt nedan:

Startdos 18,5 mg x 1. Vid behov kan dosen trappas upp till max 74 mg x 1.

Bipolär depression

Barn 10 - 18 år:

Startdos 18,5 mg x 1 i en vecka. Dosen kan sedan trappas upp till max 74 mg x 1.





Lurasidon oralt

(Latuda) tabletter

ÖVRIG INFORMATION

Förekomsten av suicidalt beteende har i vissa fall rapporterats i ett tidigt skede efter insättning eller byte av antipsykotisk behandling. Bevaka högriskpatienter noggrant under antipsykotisk behandling.

Lurasidon ska ges med försiktighet till patienter med känd hjärt-kärlsjukdom, hereditet för hjärt-kärlsjukdom, hypokalemi eller till patienter som använder QT-förlängande läkemedel t.ex. amitriptylin.

Samtidig administrering av lurasidon och andra serotonerga preparat som buprenorfin/opioider, MAO-hämmare, SSRI, SNRI samt TCA kan leda till serotonergt syndrom. Om samtidig behandling är kliniskt motiverad rekommenderas noggrann observation av patienten, speciellt vid nyinsättning samt vid doshöjningar.

Lurasidon är kontraindicerat vid samtidig administrering av starka CYP3A4-hämmare (t.ex. ketokonazol, klaritromycin och ritonavir) samt starka CYP3A4-inducerare (t.ex. fenobarbital, rifampicin och johannesört).

Akatisi (myrkrypningar) och illamående är mycket vanliga biverkningar vid behandling med lurasidon.

Risk för extrapyramidala symtom vid behandling med lurasidon som t.ex. dyskinesi (ökad muskelrörlighet), dystoni (muskelkramper) och parkinsonism.

Antidot vid extrapyramidala symtom: biperiden





Lurasidon oralt

(Latuda) tabletter

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Antidot akineton

<https://giftinformation.se/Antidot/19600130000031?query=akineton>

Internetadress Farmakainstruktion 2023 - Kunskapsstöd för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling inom BUP Stockholm

<https://www.bup.se/494342/contentassets/c5b865fe86d44fbd957c9d71eaaeadbe/farmakainstruktion-bup-stockholm.pdf>

Internetadress Regional medicinsk riktlinje - Läkemedel Bipolär sjukdom

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11800-2140136717-291/native/Bipol%C3%A4r%20sjukdom.pdf>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 5216

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-03-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT