



Vaccin: Comirnaty LP.8.1 intramuskulär inj 3 mikrog/dos

mot covid-19, barn 6 mån - 4 år

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av koncentrat till injektionsvätska, dispersion 3 mikrog/dos
(Comirnaty LP.8.1, gult lock)

Till äldre barn ska Comirnaty LP.8.1 med styrka 10 mikrog/dos respektive 30 mikrog/dos användas, se annan instruktion.

EN-STEKSPÄDNING

Comirnaty LP.8.1	NaCl 9 mg/mL		IM INJ
1 flaska	+	=	3 mikrog/0,3 mL
0,48 mL	1,1 mL		1,58 mL

Beredningsinstruktion:

INNAN SPÄDNING: Låt flaskan anta rumstemperatur. Det upptinade vaccinet kan innehålla vita till benvita ogenomskinliga partiklar. Vänd flaskan försiktigt 10 gånger, skaka inte, se Övrig information. Flaskan ska skyddas från direkt solljus.

SPÄDNING: Dra upp 1,1 mL NaCl 9 mg/mL och tillsätt detta försiktigt till flaskan med hjälp av en 21 G eller tunnare nål. Viktigt - efter avslutad tillsats, håll nålen ovanför vätskeytan och dra upp 1,1 mL luft i sprutan för att tryckutjämna och därmed undvika att vaccin läcker ut när nålen tas bort. Vänd flaskan försiktigt 10 gånger, skaka inte. Vaccinet ska nu vara klart till lätt mjölkaktigt utan synliga partiklar. Om så inte är fallet ska flaskan kasseras. Märk flaskan med datum och tidpunkt för spädningen.

IORDNINGSTÄLLANDE AV DOS: Dra försiktigt upp 0,3 mL. Standardspruta och nål kan användas för att erhålla 3 doser ur en flaska, dvs spruta och nål med låg dödvolum behövs inte. Om kvarvarande volym inte räcker till en full dos på 0,3 mL ska den resterande volymen kasseras. Vaccin från olika flaskor ska inte blandas.

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion:

Barn under 1 år: Ges i mellersta delen av lårets utsida (anterolaterala delen).

Barn från 1 år: Ges i övre tredjedelen av överarmens utsida (i deltoideusmuskeln).

Risk för anafylaktisk reaktion, patienten bör observeras i minst 15 min efter given dos.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax mot covid-19-infektion

Barn 6 mån - 4 år: 3 mikrog/DOS

För antal doser och tidsintervall mellan doserna följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regionala/lokala beslut.

ÖVRIG INFORMATION

Comirnaty LP.8.1 är ett inaktiverat vaccin och kan ges samtidigt som ett eller flera andra inaktiverade och levande försvagade vaccin. Se även referens Janusinfo.

Comirnaty LP.8.1 är ett nukleosid-modifierat mRNA-fragment som kodar för SARS-CoV-2 spike-proteinet.

Den aktiva substansen i vaccinet är inkapslad i en lipiddroppe och är därför känslig för skakningar.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Folkhälsomyndigheten Rekommendationer om vaccination mot covid-19

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-vaccination-mot-covid-19/>

Internetadress Global information om Comirnaty

<https://www.comirnatyeducation.se/>

Janusinfo Allmän information om vaccinationer

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5219

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-09-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Vaccin: Comirnaty LP.8.1 intramuskulär inj 3 mikrog/dos

mot covid-19, barn 6 mån - 4 år

RIMLIG DOS för Vaccin: Comirnaty LP.8.1 intramuskulär inj 3 mikrog/dos

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
3 mikrog	-	-	0,3 mL	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Comirnaty LP.8.1 (registrerad produkt)

1 flaska, Koncentrat till injektionsvätska, dispersion

Djupfryst vaccin (- 90 till - 60 °C) är hållbart 18 mån. Inom denna tid kan vaccinet förvaras 10 veckor i kylskåp. Innan spädning kan öppnad flaska förvaras 12 tim i rumstemp.

3 mikrog/0,3 mL, Injektionsvätska, intramuskulär

Färdigspädd lösning bör användas direkt, men ska användas inom 12 tim från spädningstillfället. Förvaras i 2 - 30 °C.