



Ciklesonid inhalation

(ex Alvesco) inhalationsspray

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Inhalationsspray 80 mikrog/inh, 160 mikrog/inh, 320 mikrog/inh (ex Alvesco)

ADMINISTRERING

Inhalation: Inhalationsspray används tillsammans med en andningsbehållare (spacer) och vid behov mask. Håll masken tätt över mun och näsa. Så snart barnet klarar av att använda munstycke bör detta användas då det ger bättre utbyte (från ca 3 års ålder).

Skölj munnen efter administrering. Vid användning av andningsbehållare (spacer) ska även huden runt näsa och mun rengöras för att undvika lokala biverkningar så som utslag på huden.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ciklesonid (registrerad produkt)

Inhalationsspray, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Infektionsutlöst astma (periodisk behandling)

(tredjehandsval vid restsituation av flutikason och beklometason)

Barn 1 mån - 5 år

Dag 1 - 3: 80 mikrog x 2

Dag 4 - 10: 80 mikrog x 1

Om symtomen försvunnit inom 1 - 2 dygn kan behandlingen avbrytas. Vid svåra episoder eller förekomst av obstruktiva besvär oftare än en gång per månad bör kontinuerlig lågdosbehandling ges.

Underhållsbehandling av obstruktiv bronkit/astma

Barn 1 mån - 5 år

(tredjehandsval vid restsituation av flutikason och beklometason)

Lågdos: 80 mikrog x 1

Medelhög dos: 80 mikrog x 2

Hög dos: 80 - 160 mikrog x 2

Observera att studier ej har genomförts på barn under 4 år. Användandet av ciklesonid till barn under 5 år rekommenderas därför enbart vid restsituation av flutikason och beklometason, samt kräver noggrann uppföljning.

Barn 6 - 11 år

Lågdos: 80 mikrog x 1

Medelhög dos: 80 mikrog x 2

Hög dos: 80 - 160 mikrog x 2

Barn 12 - 18 år

Lågdos: 80-160 mikrog x 1

Medelhög dos: 160 mikrog x 1 - 2

Hög dos: 160 - 320 mikrog x 2

Vilken dos som används styrs av patientens symtom, se behandlingstrappa i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Astma hos barn och vuxna (finns som klickbar referens).



Ciklesonid inhalation

(ex Alvesco) inhalationsspray



ÖVRIG INFORMATION

Många av doserna ovan är högre än de som är godkända i produktresumén, därför kan det vara bra att ange "Obs" på receptet.

Alla barn som har underhållsbehandling med inhalationssteroid bör längdmätas 1 - 2 ggr per år. Tillväxthastigheten kan påverkas första 1 - 2 åren efter insättning av behandling med inhalationssteroid. Låg till medelhög dos påverkar vanligen inte tillväxten.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2024.

https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Astma hos barn och vuxna

www.lakemedelsverket.se/astma

PubMed PMID Gelfand EW et al. Once-daily ciclesonide in children: efficacy and safety in asthma. J Pediatr 2006

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16615971>

PubMed PMID Loke YK et al. Impact of Inhaled Corticosteroids on Growth in Children with Asthma: Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26191797/>

PubMed PMID Ottesen et al. Local and systemic adverse effects of inhaled corticosteroids - Does ciclesonide differ from other inhaled corticosteroids? Respir Med. 2025

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39921068>

PubMed PMID Zhu et al. Quantitative comparison of different inhaled corticosteroids in the treatment of asthma in children. Pediatr Res 2023

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35545660>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarforeningen Delforeningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Astma, underhållsbehandling

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

Svenska Barnläkarforeningen Delforeningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi och Astma - Val av ICS inhalationsspray till barn 0-5 år

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>



Ciklesonid inhalation

(ex Alvesco) inhalationsspray



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Hanna Gottlieb
Fastställare/läkare: Christiane Garnemark
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 5220
Versionsnummer, major: 1
Giltig fr o m: 2025-08-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT