



Natriumpikosulfat + Magnesiumoxid + Citronsyra oralt

(ex Picoprep) pulver till oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Pulver till oral lösning:

Picoprep, godkänt från 1 års ålder och har medföljande dossked.

Citrafleet, godkänt från 18 års ålder och saknar dossked, men kan användas vid rest på Picoprep. Innehållet är i princip identiskt.

ADMINISTRERING

Dospulvret ska blandas med kallt vatten innan intag, ca 150 mL till en dospåse och ca 50 mL till en dossked. Rör om i 2 - 3 minuter.

Ibland blir lösningen varm när pulvret löses upp, låt då lösningen svalna innan administrering.

Viktigt med rikligt vätskeintag med klar dryck (inte bara vatten) under behandlingen. Klar dryck kan t ex vara juice utan fruktkött, läsk, buljong, te, kaffe (utan mjölk).

Oralt: Lösningen smakar bättre om den administreras kylskåpskall.

Enteralt: Se till att pulvret är helt upplöst innan administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Natriumpikosulfat, magnesiumoxid, citronsyra (registrerad produkt)

Pulver till oral lösning, dospåse

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Överbliven lösning eller pulver ska inte sparas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att vissa av doserna nedan avser struket dosmått med den i förpackningen medföljande dosskeden (Picoprep).

1 dossked = 4,75 mL = 1/4 dospåse = 4 gram pulver.

Viktigt med rikligt vätskeintag under behandlingen, se lokal rutin.

Vätskan ska inte bara bestå av vatten, se Administrering.

Tarmtömning inför röntgenundersökning, endoskopi eller operation

Dos 1: 10 - 18 timmar innan undersökning eller operation

Dos 2: 4 - 6 timmar innan undersökning eller operation

Om dos 2 inte kan ges 4 - 6 timmar innan undersökning eller operation, ges den kvällen före undersökningen, minst 2 timmar innan sänggående.

	Dos 1	Dos 2
Barn 12 - 23 mån:	1 dossked	1 dossked
Barn 2 - 3 år:	2 dosskedar	2 dosskedar
Barn 4 - 8 år:	1 dosPÅSE	2 dosskedar
Barn 9 - 18 år:	1 dosPÅSE	1 dosPÅSE

Tarmtömmande endagsbehandling inför uppstart av makrogol-behandling vid svår förstoppning (lokal tradition Skåne, låg evidens)

Ges som två doser dagen före start av behandling med makrogol.

Förslag till tidsintervall:

Dos 1: på morgonen

Dos 2: ca 6 timmar efter dos 1

	Dos 1	Dos 2
Barn 12 - 23 mån:	1 dossked	1 dossked
Barn 2 - 3 år:	2 dosskedar	2 dosskedar
Barn 4 - 8 år:	1 dosPÅSE	2 dosskedar
Barn 9 - 18 år:	1 dosPÅSE	1 dosPÅSE



Natriumpikosulfat + Magnesiumoxid + Citronsyra oralt

(ex Picoprep) pulver till oral lösning

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Svår förstoppning t.ex. då natriumpikosulfat orala droppar är restnoterade (ej förstahandsval)

Barn 2 - 5 år: 1 dossked x 1

Barn 6 - 11 år: 1 - 2 dosskedar x 1

Barn 12 - 18 år: 0,5 - 1 dosPÅSE x 1

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Joo et al. Alterations in colonic anatomy induced by chronic stimulant laxatives: the cathartic colon revisited. J Clin Gastroenterol. 1998

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9649012>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Vårdprogram Förslag till handläggning när natriumpikosulfat är restnoterat

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/10/2022/12/Forslag-nar-Cilaxoral-ar-restnoterat.pdf>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5258

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-08-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT