



Fenfluramin oralt 2,2 mg/mL

(Fintepla) oral lösning

INGEN SPÄDNING

ORAL LÖSN
2,2 mg/mL
120 mL alt 360 mL

ADMINISTRERING

Vid första öppnandet ska medföljande flaskadapter tryckas fast i flaskan.

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Fenfluramin oralt 2,2 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mg/kg	-	-	0,45 mL	2,27 mL
0,2 mg/kg	-	-	0,91 mL	4,55 mL
max 8,6 mg	-	-	-	3,91 mL
0,35 mg/kg, max 13 mg	-	-	1,59 mL	5,91 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fenfluramin (registrerad produkt)

2,2 mg/mL, Oral lösning

Förvaras i rumstemperatur, i skydd mot kyla. Får ej frysas. Hållbar 3 mån efter första öppnandet.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med barnneurolog.

Ordinerad dos bör avrundas till närmaste gradering på medföljande sprutor (spruta 3 mL har graderingssteg 0,1 mL, spruta 6 mL har graderingssteg 0,2 mL).

Lägre slutdos kan övervägas vid god effekt eller besvärande biverkningar.

Krampanfall/epilepsi vid Dravets syndrom, tilläggsbehandling

Barn 2 - 18 år, UTAN stiripentol

Dag 1 - 7: 0,1 mg/kg x 2

Dag 8 - 14: 0,2 mg/kg x 2

Från dag 15: 0,35 mg/kg x 2, max 13 mg/DOS

För patienter som behöver snabbare titrering kan dosen ökas var 4:e dag.

Barn 2 - 18 år, MED stiripentol

Dag 1 - 7: 0,1 mg/kg x 2

Från dag 8: 0,2 mg/kg x 2, max 8,6 mg/DOS

Krampanfall/epilepsi vid Lennox-Gastauts syndrom, tilläggsbehandling

Barn 2 - 18 år

Dag 1 - 7: 0,1 mg/kg x 2

Dag 8 - 14: 0,2 mg/kg x 2

Från dag 15: 0,35 mg/kg x 2, max 13 mg/DOS

För patienter som behöver snabbare titrering kan dosen ökas var 4:e dag.

ÖVRIG INFORMATION

Fenfluramin metaboliseras via enzymerna CYP1A2, CYP2B6 och CYP2D6. Samtidig administrering av starka inducerare och/eller hämmare av dessa enzymer kan påverka plasmakoncentrationen av fenfluramin.

(Se t.ex. <https://janusmed.se/interaktioner> (klickbar))





Fenfluramin oralt 2,2 mg/mL (Fintepla) oral lösning

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Besag FMC et al. Evaluating fenfluramine hydrochloride as an oral solution for the treatment of seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome. Expert Rev Neurother. 2024

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38315124>

PubMed PMID Frampton JE. Fenfluramine: A Review in Dravet and Lennox-Gastaut Syndromes. Drugs. 2023

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37316680>

PubMed PMID Lagae L et al. FAiRE DS Study Group. Fenfluramine hydrochloride for the treatment of seizures in Dravet syndrome: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2019

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31862249>

PubMed PMID Sullivan J et al. FAiRE DS Study Group. Fenfluramine in the treatment of Dravet syndrome: Results of a third randomized, placebo-controlled clinical trial. Epilepsia. 2023

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37543865>

PubMed PMID Wirrell EC et al. Practical considerations for the use of fenfluramine to manage patients with Dravet syndrome or Lennox-Gastaut syndrome in clinical practice. Epilepsia Open. 2024

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38962968>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrik Förening - Riktlinjer för användande av fenfluramin (Fintepla)

<https://snpf.barnlakarforeningen.se/varprogram-2/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5285

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-09-01

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

ePedID: 5285.1 Giltig fr o m: 2025-09-01

Versionshantering: http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_5285.html