



Ropivakain inf/inj 2 mg/mL

(ex Ropivacain Fresenius Kabi) flera administreringsätt

Får INTE ges intravenöst (intravasalt).

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt 1. Ropivakain 2 mg/mL (ex Ropivacaine Fresenius Kabi)
Alt 2 - 4. Spädning från Ropivakain 5 mg/mL

Kan även ges med tillsats av klonidin, se annan instruktion.

INGEN SPÄDNING

Alt 1.

INF/INJ
2 mg/mL
flera volymer finns

EN-STEGSSPÄDNING

Alt 2.

Ropivakain		NaCl 9 mg/mL		INF/INJ
5 mg/mL	+		=	2 mg/mL
20 mL		30 mL		50 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt 3.

Ropivakain		NaCl 9 mg/mL		INF/INJ
5 mg/mL	+		=	2 mg/mL
50 mL		75 mL		125 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt 4.

Ropivakain		NaCl 9 mg/mL		INF/INJ
5 mg/mL	+		=	2 mg/mL
110 mL		165 mL		275 mL

ADMINISTRERING

Epiduralt (inkl sakralt): engångsdos eller infusion/upprepade doser via en EDA

Perifer nervblockad: engångsdos eller upprepade doser/infusion via blockadkateter

Lokalinfiltration: engångsdos eller upprepade doser/infusion via sårkateter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska endast ordineras av läkare med god kännedom om komplikationsrisker, övervakning och säkerhetsåtgärder.

Dosen är beroende av vilken nerv eller vilket område som ska bedövas. Följ lokal rutin för rekommenderad dos.

Nedan anges endast MAXDOSER utifrån risk för systemisk toxicitet.

Intra- och postoperativ smärtlindring

MAXDOS engångsdos:

Nyfödda : 2 mg/kg	(1 mL/kg)
Barn 1 - 11 mån: 2 mg/kg	(1 mL/kg)
Barn 1 - 18 år: 3 mg/kg	(1,5 mL/kg)

MAXDOS infusion/upprepade doser:

Nyfödda : 0,3 mg/kg/tim	(0,15 mL/kg/tim)
Barn 1 - 11 mån: 0,3 mg/kg/tim	(0,15 mL/kg/tim)
Barn 1 - 18 år: 0,5 mg/kg/tim	(0,25 mL/kg/tim)

Dock max 300 mg inom 4 timmar. Maximal DYGNSDOS 800 mg.

ÖVRIG INFORMATION

Ropivakain har (liksom levobupivakain) längre effektduration och något längre anslagstid än många andra lokalanestesimedel. Vid behov av mer snabbverkande/kortverkande lokalanestesimedel är lidokain att föredra.





Ropivakain inf/inj 2 mg/mL

(ex Ropivacain Fresenius Kabi) flera administreringsätt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ropivakain (registrerad produkt)

5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Bruten ampull får ej sparas.

2 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Bruten ampull får ej sparas. Efter iordningställande: Hållbar 12 timmar rumstemp, 24 timmar kylskåp. Lokalt arbetssätt kan medge längre hållbarhetstid, följ lokal rutin.

REFERENS/LÄNK

Bok Coté. CJ A Practise of Anesthesia for Infants and Children, 6th edition 2019. Elsevier

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5295

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 5295

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-09-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT