



Budesonid lokalt

(ex Pulmicort)

Budesonid suspension för nebulisator används för lokalt bruk

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Suspension för nebulisator 0,125 mg/mL, 0,25 mg/mL samt 0,5 mg/mL (ex Pulmicort) för LOKALT bruk

Till äldre barn, som kan hantera dessa, rekommenderas budesonid munsönderfallande tablett, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Lokalt:

Läkemedlet ska blandas med t ex äppelmos eller halvfast näringslösning och långsamt sväljas så att det kommer i kontakt med esofaguslemhinnan, dvs inte inhaleras.

Mat, dryck och munhygien ska undvikas 30 minuter efter att dosen har administrerats då läkemedlet ska verka lokalt på esofaguslemhinnan.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Budesonid (ex Pulmicort) (registrerad produkt)

Suspension för nebulisator för LOKALT bruk

Öppnad endosbehållare hållbar 12 tim i rumstemperatur. Öppnat kuvert hållbart 3 månader. Ljuskänsligt. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Eosinofil esofagit

Bör ordineras av eller i samråd med barn gastroenterolog.

OBS - läkemedlet ska blandas med t ex äppelmos eller halvfast näringslösning och långsamt sväljas så att det kommer i kontakt med esofaguslemhinnan, dvs inte inhaleras.

Barn 1 mån - 10 år:

Induktionsbehandling, vanligen 8 - 12 veckor: 0,5 mg x 2

Underhållsbehandling: 0,125 - 0,25 mg x 1, ges med fördel på kvällen

Barn 11 - 18 år:

Induktionsbehandling, vanligen 8 - 12 veckor: 1 mg x 2

Underhållsbehandling: 0,25 - 0,5 mg x 1, ges med fördel på kvällen

Mat, dryck och munhygien ska undvikas 30 minuter efter att dosen har administrerats då läkemedlet ska verka lokalt på esofaguslemhinnan.

ÖVRIG INFORMATION

Doserna i denna ePed-instruktion stämmer inte helt överens med de doser som återfinns i det nationella vårdprogrammet för eosinofil esofagit. Detta vårdprogram är under revidering och kommer att uppdateras under våren 2024.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Warzecha J et al. A New Viscous Budesonide Formulation for the Treatment of Eosinophilic Esophagitis in Children: A Preliminary Experience and Review of the Literature

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36431208>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska föreningen för pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition, Vårdprogram för Eosinofil esofagit hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>



Budesonid lokalt

(ex Pulmicort)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5321

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-03-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT