



# Flutikason lokalt

(ex Flutide, Icsori)

## Flutikason inhalationsspray används för lokalt bruk

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Inhalationsspray 125, 250 mikrog/dos (ex Icsori) används för LOKALT bruk

Vid restsituation rekommenderas att inhalationsspray flutikason reserveras till barn under 6 år med astma, se Referens LOK.

### ADMINISTRERING

Lokalt: Flutikason ska sprejas långt bak i svalget och sväljas, dvs inte inhaleras.

Patienten ska svälja efter varje enskild sprejning.

Mat, dryck och munhygien ska undvikas 30 minuter efter att dosen har administrerats då läkemedlet ska verka lokalt på esofaguslemhinnan.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Flutikason (registrerad produkt)

Inhalationsspray för LOKALT bruk

Förvaras i rumstemperatur. Skyddas mot kyla och direkt solljus. Får ej frysas.  
Gäller båda styrkorna och alla tillverkare.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Eosinofil esofagit

Bör ordinerars av eller i samråd med barn gastroenterolog.

OBS - läkemedlet ska sprejas långt bak i svalget och sväljas, dvs inte inhaleras.

Barn 1 mån - 7 år:

Induktionsbehandling, vanligen 8 - 12 veckor: 250 mikrog x 2

Underhållsbehandling: 250 mikrog x 1, ges med fördel på kvällen

Barn 8 - 18 år:

Induktionsbehandling, vanligen 8 - 12 veckor: 375 - 750 mikrog x 2

Underhållsbehandling: 250 - 500 mikrog x 1, ges med fördel på kvällen

Patienten ska svälja efter varje enskild sprejning.

Mat, dryck och munhygien ska undvikas 30 minuter efter att dosen har administrerats då läkemedlet ska verka lokalt på esofaguslemhinnan.

### ÖVRIG INFORMATION

Doserna i denna ePed-instruktion stämmer inte helt överens med de doser som återfinns i det nationella vårdprogrammet för eosinofil esofagit. Detta vårdprogram är under revidering och kommer att uppdateras.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress LOK - Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer. Rekommendation vid brist på inhalationsspray flutikason

<https://samverkanlakemedel.se/natverket-lok/rekommendationer-vid-rester-och-brister-pa-lakemedel/rester-och-brister/2024-11-15-rekommendation-vid-brist-pa-inhalationsspray-flutikason>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska föreningen för pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition, Vårdprogram för Eosinofil esofagit hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>



## Flutikason lokalt

(ex Flutide, Icsori)



### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5322

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-11-19

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**