



flutikasonPROPIONAT lokalt

(ex Flutide, Icsori)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Inhalationsspray 125, 250 mikrog/dos (ex Icsori) används LOKALT

ADMINISTRERING

Lokalt: Flutikason ska sprejas långt bak i svalget och sväljas, dvs inte inhaleras.

Patienten ska svälja efter varje enskild sprejning.

Mat, dryck och munhygien ska undvikas 30 minuter efter att dosen har administrerats då läkemedlet ska verka lokalt på esofagusslemhinnan.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Flutikasonpropionat (registrerad produkt)

Inhalationsspray anv. LOKALT

Förvaras i rumstemperatur. Skyddas mot kyla och direkt solljus. Får ej frysas.

Gäller båda styrkorna och alla tillverkare.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Eosinofil esofagit

Bör ordinerars av eller i samråd med barn gastroenterolog.

OBS - läkemedlet ska sprejas långt bak i svalget och sväljas, dvs inte inhaleras.

Barn 1 mån - 7 år:

Induktionsbehandling, vanligen 8 - 12 veckor: 250 mikrog x 2

Underhållsbehandling: 250 mikrog x 1, ges med fördel på kvällen

Barn 8 - 18 år:

Induktionsbehandling, vanligen 8 - 12 veckor: 375 - 750 mikrog x 2

Underhållsbehandling: 250 - 500 mikrog x 1, ges med fördel på kvällen

Patienten ska svälja efter varje enskild sprejning.

Mat, dryck och munhygien ska undvikas 30 minuter efter att dosen har administrerats då läkemedlet ska verka lokalt på esofagusslemhinnan.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska föreningen för pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Vårdprogram för Eosinofil esofagit hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5322

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-03-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT