



Prometazin oralt 1 mg/mL

(Lergigan) oral lösning

INGEN SPÄDNING

ORAL LÖSN
1 mg/mL
300 mL

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Prometazin (registrerad produkt)

1 mg/mL, Oral lösning

Förvaras vid högst 25 °C, i skydd mot kyla.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas pga biverkningsrisk, se Övrig information.

Ångest och oro (ej förstahandsval)

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Barn 2 - 4 år: 5 mg x 1 - 3

Barn 5 - 12 år: 10 mg x 1 - 3

Barn 13 - 18 år: 5 - 25 mg x 1 - 3

Sömnstörning (ej förstahandsval)

Behandlingen bör hanteras inom barn och ungdomspsykiatri och följas upp noggrant.

Barn 2 - 4 år: 5 - 20 mg x 1

Barn 5 - 12 år: 20 - 25 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 20 - 25 mg x 1

Ges 1 - 2 tim innan sänggående.

Åksjuka (ej förstahandsval)

Barn 2 - 4 år: 5 mg x 1

Barn 5 - 12 år: 10 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 20 - 25 mg x 1

Ges 1 - 2 timmar innan resa, alternativt kan prometazin ges kvällen innan resan.

Klåda och allergi (rekommenderas inte)

För prometazin finns godkänd indikation klåda och allergier för barn sedan lång tid tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa rekommenderas istället för prometazin



Prometazin oralt 1 mg/mL

(Lergigan) oral lösning



ÖVRIG INFORMATION

Risk för hangover-effekt och kvarstående sedering vid terapeutiska doser. Vid överdos finns risk för sedativ och uttalad antikolinerg effekt.

Yngre barn reagerar ofta med CNS-excitation (oro, hallucinationer, muskelryckningar) medan äldre barn och vuxna i högre utsträckning får CNS-depression som i uppvakningskedet ofta följs av kvarstående centrala antikolinerga symtom.

Samtidigt intag av alkohol och centraldämpande medel förstärker den sedativa effekten och ska därför undvikas. Även samtidig behandling med neuroleptika bör undvikas.

Lösningen innehåller 47,6 mg etanol/mL. Ett svenskt standardglas öl/vin/sprit innehåller 12 gram etanol.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Farmakainstruktion 2025 Kunskapsstöd för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling inom BUP Stockholm

<https://www.bup.se/om-oss/samarbeten-och-samverkan/for-dig-som-ar-vardgivare/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

<https://tinyurl.com/somnsvarigheterbarn>

PubMed PMID De Bruyne et al. Are antihistamines effective in children? A review of the evidence. Arch Dis Child. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335428>

PubMed PMID Höjer J, Tellerup M. Renässans för Lergigan med kraftig ökning av intoxicationsfall [Promethazine - an old pharmaceutical that has got a renaissance. An avalanche-like increase in the number of overdose cases in Sweden]. Lakartidningen. 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30040111>

PubMed PMID Thunander Sundbom L et al. Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxication. Lakartidningen 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34590703>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>



Prometazin oralt 1 mg/mL

(Lergigan) oral lösning



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 5330

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-03-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT