



Tolterodin oralt

(fd Detrusitol) tabletter/depotkapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 1 och 2 mg (Tolterodine Accord)
Depotkapslar 2 och 4 mg (ex Tolterodine STADA)

ADMINISTRERING

Oralt: Tabletter kan krossas och slammas upp i vatten eller blandas med mjuk mat i direkt anslutning till administrering.

Depotkapslar ska ej delas, sväljes hela.

Enteralt: Tabletter kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Tolterodin (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

Depotkapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad burk hållbar 200 dagar. Gäller båda styrkorna och alla tillverkare.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att tolterodin inte är förstahandsalternativ vid behandling av nedanstående indikationer.

Ordineras endast i samråd med barnläkare och/eller barnurolog.

Neurogen detrusoöveraktivitet

Barn 5 - 18 år: 1 mg x 1 - 2

Dosen anpassas individuellt och kan ökas till max 4 mg/DYGN.

Vid god effekt titreras till lägsta effektiva dos och uttrappningsförsök bör göras ett par gånger årligen.

Nokturn enures

Barn 6 - 18 år: 2 mg x 1

Endast tablett får användas på denna indikation. Dosen ges på kvällen ca 60 min innan sänggående.

Dosen anpassas individuellt och kan ökas till max 4 mg/DYGN.

Behandling utvärderas efter 1 - 2 månader. Vid god effekt titreras till lägsta effektiva dos och uttrappningsförsök bör göras ett par gånger årligen.

Vid otillräcklig effekt kan desmopressin adderas, se annan instruktion.

Behandling bör utvärderas efter 1 månad och regelbundna desmopressinuppehåll bör göras för att utvärdera behovet av tilläggsbehandling.

Terapiresistent urininkontinens

Barn 6 - 18 år: 2 mg x 1

Dosen anpassas individuellt och kan ökas till max 4 mg/DYGN.

Behandling utvärderas efter 6 - 8 veckor. Vid god effekt titreras till lägsta effektiva dos och uttrappningsförsök bör göras ett par gånger årligen.





Tolterodin oralt

(fd Detrusitol) tabletter/depotkapslar

ÖVRIG INFORMATION

Antikolinergisk behandling ökar risken för konstipation och ackumulering av residualurin. Uppföljning krävs med kontroll av urinflöde, residualurin och blodtryck.

På grund av risk för minskad salivutsöndring är även noggrann tandhygien viktig under behandlingstiden.





Tolterodin oralt

(fd Detrusitol) tabletter/depotkapslar

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

Internetadress Svenska Enuresakademin, vårdprogram daginkontinens 2024

https://www.svenskaenures.se/home/hur_far_jag_hjalp.html

Internetadress Svenska Enuresakademin, vårdprogram enures 2024

https://www.svenskaenures.se/home/hur_far_jag_hjalp.html

PubMed PMID Koç B et al. Efficacy of tolterodine in children with overactive bladder. Turk Pediatr Ars. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33061757>

PubMed PMID Medhi B et al. Comparison of tolterodine with standard treatment in pediatric patients with non-neurogenic dysfunctional voiding/over active bladder: a systematic review. Indian J Physiol Pharmacol. 2013

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24968572>

PubMed PMID Melling CV et al. Current pharmacological management of idiopathic overactive bladder in children in the UK: a national survey of practice. J Pediatr Urol. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31810880>

PubMed PMID Nijman RJ et al. Tolterodine treatment for children with symptoms of urinary urge incontinence suggestive of detrusor overactivity: results from 2 randomized, placebo controlled trials. J Urol. 2005

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15758796>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrisk Förening - Läkemedelsbehandling vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn och ungdomar

<https://snpf.barnlakarforeningen.se/varprogram-2/nationella-riktlinjer-for-medicinsk-uppfoljning-vid-ryggmargsbrack-mmc/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Hanna Gottlieb

ePedID: 5339

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-08-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT