



Solifenacin oralt

(ex Vesicare) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 5 och 10 mg (ex Vesicare)

ADMINISTRERING

Oralt: Tabletter får ej krossas.

Tabletter Solifenacin Sandoz kan delas i två lika stora doser.

Enteralt: Oral suspension rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Solifenacin (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackning. Gäller båda styrkorna och alla tillverkare. Tabletter Solifenacin STADA är fuktkänsliga.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att solifenacin inte är förstahandsalternativ vid behandling av nedanstående indikationer.

Ordineras endast i samråd med barnläkare och/eller barnurolog.

Neurogen detrusoröveraktivitet

Barn 6 - 18 år: 5 mg x 1

Dosen anpassas individuellt och kan ökas till max 10 mg/DYGN.

Vid god effekt titreras till lägsta effektiva dos och uttrappningsförsök bör göras ett par gånger årligen.

Nokturn enures

Dosen ska tas ca 60 min innan sänggåendet.

Barn 6 - 18 år: 5 mg x 1

Behandling utvärderas efter 1 - 2 månader. Vid otillräcklig effekt kan desmopressin adderas, se annan instruktion. Behandling bör utvärderas efter 1 månad och regelbundna desmopressinuppehåll bör göras för att utvärdera behovet av tilläggsbehandling.

Terapiresistent urininkontinens

Barn 6 - 18 år: 5 mg x 1

Dosen anpassas individuellt och kan ökas till max 10 mg/DYGN.

Behandling utvärderas efter 6 - 8 veckor. Vid god effekt titreras till lägsta effektiva dos och uttrappningsförsök bör göras ett par gånger årligen.





Solifenacin oralt

(ex Vesicare) tabletter

ÖVRIG INFORMATION

Antikolinergisk behandling ökar risken för konstipation och ackumulering av residualurin. Uppföljning krävs med kontroll av urinflöde, residualurin och blodtryck.

På grund av risk för minskad salivutsöndring är även noggrann tandhygien viktig under behandlingstiden.





Solifenacin oralt

(ex Vesicare) tabletter

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Enuresakademin, vårdprogram daginkontinens 2024

https://www.svenskaenures.se/home/hur_far_jag_hjalp.html

Internetadress Svenska Enuresakademin, vårdprogram enures 2024

https://www.svenskaenures.se/home/hur_far_jag_hjalp.html

PubMed PMID Franco I. Long-term efficacy and safety of solifenacin in pediatric patients aged 6 months to 18 years with neurogenic detrusor overactivity: results from two phase 3 prospective open-label studies. J Pediatr Urol. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007426>

PubMed PMID Ghanavati PM, et al. A comparison of the efficacy and tolerability of treating primary nocturnal enuresis with Solifenacin Plus Desmopressin, Tolterodine Plus Desmopressin, and Desmopressin alone: a RCT. Int Braz J Urol. 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32840337>

PubMed PMID Mansour I et al. Efficacy and Safety of Mirabegron Compared to Solifenacin in Treatment of Non-neurogenic Overactive Bladder in Children: A Randomized Controlled Trial. Int Braz J Urol. 2025

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39913092>

PubMed PMID Nevéus T, et al. Management and treatment of nocturnal enuresis-an updated standardization document from the International Children's Continence Society. J Pediatr Urol. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32278657>

PubMed PMID Raman G, et al. Safety and tolerability of solifenacin in children and adolescents with overactive bladder- a systematic review. J Pediatr Urol. 2023

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36336627>

PubMed PMID Tannenbaum S et al. Pharmacokinetics of solifenacin in pediatric populations with overactive bladder or neurogenic detrusor overactivity. Pharmacol Res Perspect. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33231929>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrisk Förening - Läkemedelsbehandling vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn och ungdomar

<https://snpf.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/nationella-riktlinjer-for-medicinsk-uppfoljning-vid-ryggmargsbrack-mmc/>



Solifenacin oralt

(ex Vesicare) tabletter



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Hanna Gottlieb
Fastställare/läkare: Christiane Garnemark
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 5340
Versionsnummer, major: 1
Giltig fr o m: 2025-08-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT