



# Mirabegron oralt

(ex Betmiga) depottabletter

**Mirabegron kan orsaka hypertension hos barn. Vid insättning bör blodtrycksmätningar utföras före behandlingsstart och regelbundet under behandlingstiden.**

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depottabletter 25 och 50 mg (ex Betmiga)

## ADMINISTRERING

Oralt: Depottabletter ska sväljas hela, får ej delas eller krossas.  
Tas i samband med måltid.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Mirabegron (registrerad produkt)

Depottablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att mirabegron inte är förstahandsalternativ för behandling av nedanstående indikationer. Mirabegron kan vara ett alternativ vid biverkningar/otillräcklig effekt av antikolinergika i monoterapi. Ordinerar endast i samråd med barnläkare/barnurolog.

### Neurogen detrusoröveraktivitet

Barn med kroppsvikt över 35 kg: 25 mg x 1

Dosen utvärderas efter 4 -8 veckor och anpassas individuellt. Kan ökas till max 50 mg/DYGN.

Vid långtidsbehandlig ska uppföljning ske minst en gång per år för utvärdering och eventuell dosjustering.

### Nokturn enures

Ges på kvällen i samband med måltid.

Barn med kroppsvikt över 35 kg: 25 mg x 1

Dosen utvärderas efter 4 -8 veckor och anpassas individuellt. Kan ökas till max 50 mg/DYGN.

Vid god effekt titreras till lägsta effektiva dos och uttrappningsförsök bör göras ett par gånger årligen.

### Terapiresistent urininkontinens

Barn med kroppsvikt över 35 kg: 25 mg x 1

Dosen utvärderas efter 4 -8 veckor och anpassas individuellt. Kan ökas till max 50 mg/DYGN.

Vid god effekt titreras till lägsta effektiva dos och uttrappningsförsök bör göras ett par gånger årligen.



## Mirabegron oralt

(ex Betmiga) depottabletter



### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Enuresakademin, vårdprogram daginkontinens 2024

[https://www.svenskaenures.se/home/hur\\_far\\_jag\\_hjalp.html](https://www.svenskaenures.se/home/hur_far_jag_hjalp.html)

Internetadress Svenska Enuresakademin, vårdprogram enures 2024

[https://www.svenskaenures.se/home/hur\\_far\\_jag\\_hjalp.html](https://www.svenskaenures.se/home/hur_far_jag_hjalp.html)

Micromedex

PubMed PMID Baka-Ostrowska M et al. Efficacy and safety of mirabegron in children and adolescents with neurogenic detrusor overactivity: An open-label, phase 3, dose-titration study. Neurourol Urodyn. 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34058027>

PubMed PMID Fryer S. Effectiveness and tolerability of mirabegron in children with overactive bladder: A retrospective pilot study. J Pediatr Surg. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31759655>

PubMed PMID Mansour I et al. Efficacy and Safety of Mirabegron Compared to Solifenacin in Treatment of Non-neurogenic Overactive Bladder in Children: A Randomized Controlled Trial. Int Braz J Urol. 2025

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39913092>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrik Förening - Läkemedelsbehandling vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn och ungdomar

<https://snpf.barnlakarforeningen.se/varldprogram-2/nationella-riktlinjer-for-medicinsk-uppfoljning-vid-ryggmargsbrack-mmc/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Hanna Gottlieb

ePedID: 5343

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2025-08-28

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**