



## Vaccin: Comirnaty JN.1 intramuskulär inj 3 mikrog/dos

mot covid-19, barn 6 mån - 4 år

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av koncentrat till injektionsvätska, dispersion 3 mikrog/dos  
(Comirnaty JN.1, gult lock)

Till äldre barn ska Comirnaty JN.1 med styrka 10 mikrog/dos respektive 30 mikrog/dos användas, se annan instruktion.

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 1: Comirnaty JN.1, 3 mikrog/dos, gult lock

Comirnaty JN.1, 3 mikrog/dos	NaCl 9 mg/mL		IM INJ
1 flaska	+		= 3 mikrog/0,3 mL
0,48 mL		1,1 mL	1,58 mL

#### Beredningsinstruktion:

INNAN SPÄDNING: Låt flaskan anta rumstemperatur. Det upptinade vaccinet kan innehålla vita till benvita ogenomskinliga partiklar. Vänd flaskan försiktigt 10 gånger, skaka inte (se Övrig information). Flaskan ska skyddas från direkt solljus.

SPÄDNING: Dra upp 1,1 mL NaCl 9 mg/mL och tillsätt detta försiktigt till flaskan med hjälp av en 21 G eller tunnare nål. Viktigt - efter avslutad tillsats, håll nålen ovanför vätskeytan och dra upp 1,1 mL luft i sprutan för att tryckutjämna och därmed undvika att vaccin läcker ut när nålen tas bort. Vänd flaskan försiktigt 10 gånger, skaka inte. Vaccinet ska nu vara vitt till benvitt utan synliga partiklar. Om så inte är fallet ska flaskan kasseras. Märk flaskan med datum och tidpunkt för spädningen.

ORDNINGSTÄLLANDE AV DOS: Dra försiktigt upp 0,3 mL. Standardspruta och nål kan användas för att erhålla 3 doser ur en flaska, dvs spruta och nål med låg dödvoly m behövs inte. Om kvarvarande volym inte räcker till en full dos på 0,3 mL ska den resterande volymen kasseras. Vaccin från olika flaskor ska inte blandas.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Profylax mot covid-19-infektion

Barn 6 mån - 4 år: 3 mikrog/DOS (0,3 mL)

För antal doser och tidsintervall mellan doserna följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regionala/lokala beslut.

### ÖVRIG INFORMATION

Comirnaty JN.1 är ett nukleosid-modifierat mRNA-fragment som kodar för SARS-CoV-2 spike-proteinet.

Den aktiva substansen i vaccinet är inkapslad i en lipiddroppe och är därför känslig för skakningar.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccination mot covid-19

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/>

Internetadress Global information om Comirnaty

<https://www.comirnatyeducation.se/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5363

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2025-01-22

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**





## Vaccin: Comirnaty JN.1 intramuskulär inj 3 mikrog/dos

mot covid-19, barn 6 mån - 4 år

### ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion:

Vaccinet ska anta rumstemperatur innan administrering.

Barn under 1 år: Rekommenderas att ges i mellersta delen av lårets utsida (anterolaterala delen).

Barn från 1 år: Rekommenderas att ges i deltoideusmuskeln i överarmen.

Risk för anafylaktisk reaktion, patienten bör observeras i minst 15 min efter given dos.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Comirnaty JN.1, 3 mikrog/dos (registrerad produkt)

1 flaska, Koncentrat till injektionsvätska, dispersion

Djupfrys vaccinet (-90 till -60 °C) är hållbart 18 mån. Inom denna tid kan vaccinet förvaras 10 veckor i kylskåp. Innan spädning kan öppnad flaska förvaras 12 tim i rumstemp.

3 mikrog/0,3 mL, Injektionsvätska, intramuskulär

Färdigspädd lösning bör användas direkt, men ska användas inom 12 tim från spädningstillfället. Förvaras i 2 - 30 °C.