levoTYROxin intravenös inj 20 mikrog/mL

(Levothyroxine SERB)

EN-STEGSSPÄDNING

Levotyroxin 200 mikrog/mL 1 mL	+	NaCl 9 mg/mL 9 mL	=	INJ LÖ **20 mikrog/mL** 10 mL

ADMINISTRERING

Intravenös injektion: 2 - 3 min

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Levotyroxin (registrerad produkt)

200 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Öppnad ampull får ej sparas.

20 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning

Iordningställd lösning får inte sparas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordineras i samråd med barnendokrinolog

Hypotyreos där oral behandling inte är möjlig

Dosen ska inte vara mer än 50 - 80 % av patientens orala dos.
Justeras efter individuellt behov.

REFERENS/LÄNK

FASS
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Micromedex

Rekommendation , (Grade 1B)
https://www.gradeworkinggroup.org/

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson
Fastställare/läkare: Christiane Garnemark
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 5366
Versionsnummer, major: 1
Giltig fr o m: 2026-09-01

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT