



Droperidol intravenös inj 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL

(ex Dridol)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt 1: Injektionsvätska 0,5 mg/mL (Droperidol Sintetica)

Styrkan kan vara uttryckt 1,25 mg/2,5 mL

Alt 2: Spädning från injektionsvätska 2,5 mg/mL (ex Dridol)

INGEN SPÄDNING

Alt. 1

INJ LÖ
0,5 mg/mL
2,5 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Droperidol 2,5 mg/mL 1 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 4 mL	=	INJ LÖ 0,5 mg/mL 5 mL
---------------------------------	---	---	---	------------------------------------

ADMINISTRERING

Intravenös injektion: 2 - 5 min

Ges 30 min före förväntat operationsslut.

RIMLIG DOS för Droperidol intravenös inj 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mikrog/kg	-	-	0,2 mL	1 mL
15 mikrog/kg	-	-	0,3 mL	1,5 mL
max 1,25 mg	-	-	-	2,5 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Postoperativt illamående och kräkningar (PONV), profylax och behandling (inte förstahandsval)

Barn 2 - 18 år: 10 - 15 (- 30) MIKROG/kg = 0,01 - 0,015 (- 0,03) mg/kg

Max 1,25 mg/DOS

Dosen kan upprepas var 6:e timme vid behov.

Denna dos är lägre än den i t ex produktresumén, men studier och erfarenhet har visat att lägre dos ofta är tillräckligt.

ÖVRIG INFORMATION

Droperidol är ett neuroleptikum som blockerar dopaminreceptorer i kemotriggerzonen.

Kontraindicerat vid hypokalemi eller hypomagnesi, bradykardi och svår depression.

Risken för QT-förlängning kan vara något ökad. Förlängd QT-tid kan i vissa fall leda till

Torsade de Pointes (se Referens Janusmed/riskprofil).



Droperidol intravenös inj 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL (ex Dridol)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Droperidol (registrerad produkt)

2,5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten ampull får ej sparas.

0,5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten ampull får ej sparas. Efter iordningställande: hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

ePed Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Janusinfo Janusmed riskprofil

<https://janusmed.se/riskprofil>

Läkemedelsverket Läkemedelsfakta - Droperidol Sintetica

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel/20220113000016/droperidol-sintetica-0-5-mg-ml-injektionsvatska-losning>

PubMed PMID Gan TJ et al: Fourth Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting Anesth Analg 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32467512>

PubMed PMID Höhne C. Postoperative nausea and vomiting in pediatric anesthesia. Curr Opin Anaesthesiol 2014

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24722005>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5381

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-09-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT