



Atovakvon + Proguanil oralt

(ex Malarone Junior) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kombinationspreparat innehållande atovakvon och proguanil, första styrkeangivelsen avser atovakvon.

Tablett 62,5 + 25 mg (Malarone Junior)

Tablett 250 + 100 mg (ex Malastad)

ADMINISTRERING

Tabletterna saknar brytskåra, men kliniskt förekommer delning av tablett 62,5/25 mg för att kunna ge dos till de minsta barnen. Delning ska göras med tablettdelare och kvarvarande del (1/2 tablett) ska sparas och ges till samma patient vid nästföljande doseringstillfälle.

Oralt: Bör tas tillsammans med mat, helst fettrik sådan, eller mjölk då det förbättrar upptaget.

Vid sväljsvårigheter kan tabletterna krossas och blandas med mat eller mjölk i direkt anslutning till administreringen.

Enteralt:

Tabletterna kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

OBS - vid ofullständig krossning kan bitar av drageringen orsaka stopp i tunn sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Atovakvon + Proguanil (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna och alla fabrikat. För Provaqomyl anges att tabletterna ska förvaras i originalförpackning, fukt känsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Första dosangivelsen avser atovakvon.

Profylax mot malaria

Barn 5 - 7 kg:	31,25/12,5 mg x 1	(1/2 tablett á 62,5/25 mg)
Barn 8 - 9 kg:	46,88/18,75 mg x 1	(3/4 tablett á 62,5/25 mg)
Barn 10 - 19 kg:	62,5/25 mg x 1	(1 tablett á 62,5/25 mg)
Barn 20 - 29 kg:	125/50 mg x 1	(2 tabletter á 62,5/25 mg)
Barn 30 - 40 kg:	187,5/75 mg x 1	(3 tabletter á 62,5/25 mg)
Barn över 40 kg:	250/100 mg x 1	(1 tablett á 250/100 mg)

Profylaxen ska starta senast ankomstdagen till område med malaria, men kan starta 1 - 2 dagar innan. Profylaxen ska fortsätta i 7 dagar efter avresa från malariaområdet.

Behandling av icke allvarlig malaria

Ordineras i samråd med infektionsspecialist.

Barn 5 - 8 kg:	125/50 mg x 1	(2 tabletter á 62,5/25 mg)
Barn 9 - 10 kg:	187,5/75 mg x 1	(3 tabletter á 62,5/25 mg)
Barn 11 - 20 kg:	250/100 mg x 1	(1 tablett á 250/100 mg)
Barn 21 - 30 kg:	500/200 mg x 1	(2 tabletter á 250/100 mg)
Barn 31 - 40 kg:	750/300 mg x 1	(3 tabletter á 250/100 mg)
Barn över 40 kg:	1000/400 mg x 1	(4 tabletter á 250/100 mg)

Behandlingstid: 3 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Kräkning förekommer som biverkan av atovakvon + proguanil. Om kräkning inträffar inom 1 timme efter dosintag ska dosen tas igen.



Atovakvon + Proguanil oralt

(ex Malarone Junior) tabletter



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Institute of Tropical Medicine Antwerpen, Wanda - travel in good health.
Malaria tablets: dose for children.

<https://artsen.wanda.be/en/a-z-index/malaria-tablets-dose-for-children>

Internetadress Svenska Infektionsläkarföreningen - Malariaprofylax, riktlinje

<https://infektion.net/kunskap-dokument/kunskap/riktlinjer-och-rekommendationer/>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5421

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-08-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT