



Meflokin oralt 250 mg

(Lariam) tablett

ADMINISTRERING

Tabletten har krysskåra och kan delas i kvarts tablett, halv tablett och trekvarts tablett för att ge lägre dos.

Oralt:

Ska helst tas tillsammans med mat.

Vid sväljsvårigheter kan tabletten, eller del av tabletten, krossas och blandas med vätska i direkt anslutning till administreringen. Tabletten har dock mycket bitter smak.

Enteralt:

Tabletten, eller del av tabletten, kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Meflokin (registrerad produkt)

250 mg, Tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen, fuktkänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax mot malaria

Doseras en gång per vecka på samma veckodag.

Barn 5 - 20 kg: 62,5 mg (1/4 tablett)

Barn 21 - 30 kg: 125 mg (1/2 tablett)

Barn 31 - 45 kg: 187,5 mg (3/4 tablett)

Barn över 45 kg: 250 mg (1 tablett)

Profylaxen bör starta minst en vecka innan resa och fortsätta i 4 veckor efter avresa från malariaområdet. Ibland rekommenderas start 3 - 4 veckor innan resa för att eventuella biverkningar ska upptäckas före avresa.

Behandling av icke allvarlig malaria

Ordineras i samråd med infektionsspecialist.

Rekommenderad totaldos: 20 - 25 mg/kg, max 1500 mg

Totaldosen bör delas upp på 2 - 3 doseringstillfällen med 6 - 8 timmar mellan doserna, se dosschema nedan. Detta för att begränsa förekomsten och svårighetsgraden av biverkningar.

	Antal tabletter	Dosschema
Barn 5 - 20 kg:	1/4 tablett per 2,5 - 3 kg eller 1 tablett per 10 - 12 kg	
Barn 21 - 30 kg:	2 - 3	2 - 3 + 0
Barn 31 - 45 kg:	3 - 4	3 (+ 1)
Barn 46 - 60 kg:	5	3 + 2
Barn över 60 kg:	6	3 + 2 + 1

ÖVRIG INFORMATION

Kräkning är en vanlig biverkan av meflokin.

Om kräkning sker inom 30 minuter efter dosintag ska en ny fulldos tas.

Om kräkning inträffar 30 - 60 minuter efter dosintag ska halv dos tas igen.

Vid kräkning senare än en timme tas ingen ny dos.



Meflokin oralt 250 mg

(Lariam) tablett



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Institute of Tropical Medicine Antwerpen, Wanda - travel in good health.
Malaria tablets: dose for children.

<https://artsen.wanda.be/en/a-z-index/malaria-tablets-dose-for-children>

Internetadress Svenska Infektionsläkarföreningen - Malariaprofylax, riktlinje

<https://infektion.net/kunskap-dokument/kunskap/riktlinjer-och-rekommendationer/>

PubMed PMID Schlagenhauf P et al. Use of mefloquine in children - a review of dosage, pharmacokinetics and tolerability data. Malar J. 2011

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21981927>

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5422

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-08-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT