



## Tranexamsyra oralt

(ex Cyklokapron) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 500 mg (ex Cyklokapron)  
Brustablett 1 gram (= 1000 mg) (Cyklokapron)

### ADMINISTRERING

Tablett Tranexamsyra Orifarm, Cyklonova och Tranexa kan delas i två lika stora doser.  
Tablett Cyklo-F och Cyklokapron kan endast delas för att underlätta nedsväljning.

Oralt

Enteralt:

Oral lösning rekommenderas i första hand, se annan instruktion.  
Brustabletten kan lösas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen, kan ges i nasogastrisk sond från 6 Fr.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Tranexamsyra (registrerad produkt)

500 mg, Tablett

Förvaras i rumstemperatur.

1 gram, Brustablett

Förvaras i originalförpackningen, fukt känsligt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Blödning eller ökad risk för blödning

Ordineras endast i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

Barn 1 mån - 18 år: 20 (- 30) mg/kg x 3 - 4, max 1500 mg/DOS

Behandlingstiden varierar beroende på indikation.

#### Riklig menstruationsblödning

Barn 12 - 18 år: 1000 - 1500 mg x 3 (- 4) upp till fyra dagar, max 6000 mg/DYGN

### ÖVRIG INFORMATION

Tranexamsyra bör användas med försiktighet vid hematuri, trombos samt vid disseminerad intravasal koagulation (DIC).





## Tranexamsyra oralt (ex Cyklokapron) tabletter

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Brandão, L. R et al. (2025). SickKids handbook of pediatric thrombosis and hemostasis (3rd rev. and expanded ed.)

Micromedex

PubMed PMID Lacy B et al. NASPAG Clinical Consensus: Use of Tranexamic Acid in the Treatment of Heavy Menstrual Bleeding. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2025

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/40651840>

PubMed PMID O'Brien SH et al. An Open-Label, Single-Arm, Efficacy Study of Tranexamic Acid in Adolescents with Heavy Menstrual Bleeding. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2019

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30731217>

PubMed PMID Srivastava A et al. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia panelists and co-authors. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32744769>

PubMed PMID Srivaths LV et al. Oral Tranexamic Acid versus Combined Oral Contraceptives for Adolescent Heavy Menstrual Bleeding: A Pilot Study. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2015

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26024940>

PubMed PMID van Galen et al. Antifibrinolytic therapy for preventing oral bleeding in patients with haemophilia or Von Willebrand disease undergoing minor oral surgery or dental extractions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26704192>

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#5425](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5425)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Hanna Gottlieb

ePedID: 5425

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2026-01-28

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**