



Sakubitril + Valsartan oralt

(Entresto) tabletter/kapslar

Får ges tidigast 36 timmar efter avslutad behandling med ACE-hämmare. Detsamma gäller vid insättning av ACE-hämmare efter avslutad behandling med Entresto.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kombinationspreparat innehållande sakubitril och valsartan, första styrkeangivelsen avser mängd sakubitril.

Granulat i kapslar avsedda att öppnas 6 + 6 mg och 15 + 16 mg

Tabletter 24 + 26 mg, 49 + 51 mg och 97 + 103 mg

ARBETSMILJÖ

Möjlig risk för fosterskador, hantera enligt lokal rutin. Se Övrig information.

ADMINISTRERING

Oralt:

Kapseln MÅSTE öppnas före administrering. Strö innehållet på en liten mängd mjuk mat i direkt anslutning till administrering. Kapseln får inte sväljas.

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering.

Enteralt: Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Sakubitril + Valsartan (registrerad produkt)

Kapsel, hård

Förvaras i originalförpackningen, fukt känsligt. Gäller båda styrkorna.

Tablett

Förvaras i originalförpackningen, fukt känsligt. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Får ges tidigast 36 timmar efter avslutad behandling med ACE-hämmare. Detsamma gäller vid insättning av ACE-hämmare efter avslutad behandling med Entresto.

Kontrollera och monitorera S-Kalium innan och under behandling, se Övrig information.

Första dosangivelsen avser mängd sakubitril.

Hjärtsvikt

Halva startdosen rekommenderas om patienten inte har behandlats med ACE-hämmare/ARB tidigare, samt hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Barn 1 - 18 år

Under 40 kg: GRANULAT I KAPSLAR

Startdos: 1,6 mg/kg x 2

Intermediär underhållsdos: 2,3 mg/kg x 2

Underhållsdos: 3,1 mg/kg x 2

Dessa doser avser kombinerade mängden sakubitril och valsartan. Kan avrundas till hela kapslar enligt nedan.

Vikt 13 - 18 kg

Startdos i två veckor: 12/12 mg x 2

Intermediär underhållsdos i två veckor: 18/18 mg x 2

Underhållsdos: 24/24 mg x 2

Vikt 19 - 25 kg

Startdos i två veckor: 18/18 mg x 2

Intermediär underhållsdos i två veckor: 24/24 mg x 2

Underhållsdos: 30/32 mg x 2





Sakubitril + Valsartan oralt

(Entresto) tabletter/kapslar

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vikt 26 - 33 kg	
Startdos i två veckor:	24/24 mg x 2
Intermediär underhållsdos i två veckor:	30/32 mg x 2
Underhållsdos:	45/48 mg x 2
Vikt 34 - 39 kg	
Startdos i två veckor:	30/32 mg x 2
Intermediär underhållsdos i två veckor:	45/48 mg x 2
Underhållsdos:	60/64 mg x 2
Från 40 kg: TABLETTER i första hand	
Vikt 40 - 50 kg	
Startdos i två veckor:	24/26 mg x 2
Intermediär underhållsdos i två veckor:	49/51 mg x 2
Underhållsdos:	72/78 mg x 2
Vikt över 50 kg	
Startdos i två veckor:	49/51 mg x 2
Intermediär underhållsdos i två veckor:	72/78 mg x 2
Underhållsdos:	97/103 mg x 2

ÖVRIG INFORMATION

Behandling ska inte påbörjas om S-Kalium är över 5,3 mmol/L hos pediatrika patienter. Monitorering av S-Kalium rekommenderas, särskilt hos patienter med riskfaktorer som njurfunktionsnedsättning, diabetes, hypoadosteronism, står på diet med högt kaliumintag eller tar mineralkortikoidantagonister.

Exponering för ARB-behandling under andra och tredje trimestern är känd för att inducera human fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skullförbening) och neonatal toxicitet (njursvikt, hypotension och hyperkalemi).



Sakubitril + Valsartan oralt

(Entresto) tabletter/kapslar



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Don't Rush to Crush. The Society of Hospital Pharmacists of Australia. Fourth edition, 2021.

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Produktinformation PRESCRIBING INFORMATION- Entresto tablets and sprinkle, Novartis. 2024

https://www.novartis.com/us-en/sites/novartis_us/files/entresto.pdf

PubMed PMID A. Konduri et al. Single-Center Experience with Sacubitril/Valsartan in Patients with Congenital Heart Disease. *Pediatr Cardiol.* 2025.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/40719869>

PubMed PMID H. Zha et al. Transforming pediatric heart failure: Efficacy of low-dose sacubitril/valsartan. *Review Curr Probl Cardiol.* 2025.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39510399>

PubMed PMID R. Shaddy et al. Sacubitril/Valsartan in Pediatric Heart Failure (PANORAMA-HF): A Randomized, Multicenter, Double-Blind Trial. *Circulation.* 2024.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39319469>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger

ePedID: 5450

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-01-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT