



Vaccin: Comirnaty LP.8.1 intramuskulär inj 30 mikrog/dos mot covid-19, barn 12 - 18 år

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektionsvätska, dispersion 30 mikrog/dos (Comirnaty LP.8.1, grått lock)

Till yngre barn ska Comirnaty LP.8.1 med styrka 3 mikrog/dos respektive 10 mikrog/dos användas, se annan instruktion.

INGEN SPÄDNING

IM INJ
30 mikrog/0,3 mL
2,25 mL

Beredningsinstruktion:

INNAN IORDNINGSTÄLLANDE AV DOS: Låt flaskan anta rumstemperatur. Det upptnade vaccinet kan innehålla vita till benvita ogenomskinliga partiklar. Vänd flaskan försiktigt 10 gånger, skaka inte, se Övrig information. Flaskan ska skyddas från direkt solljus. Efter vändningarna ska vaccinet vara vitt till benvitt utan synliga partiklar.

IORDNINGSTÄLLANDE AV DOS: Dra försiktigt upp 0,3 mL. Om spruta och/eller nål med låg dödvolum används (max 35 mikroliter) kan 6 doser erhållas ur en flaska. Om kvarvarande volym inte räcker till en full dos på 0,3 mL ska den resterande volymen kasseras. Vaccin från olika flaskor ska inte blandas.

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion:
Rekommenderat administreringsställe är övre tredjedelen av överarmens utsida (i deltoideusmuskeln).

Risk för anafylaktisk reaktion, patienten bör observeras i minst 15 min efter given dos.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

RIMLIG DOS för Vaccin: Comirnaty LP.8.1 intramuskulär inj 30 mikrog/dos

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
30 mikrog	-	-	-	0,3 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax mot covid-19-infektion

Barn 12 - 18 år: 30 mikrog/DOS

För antal doser och tidsintervall mellan doserna följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regionala/lokala beslut.

ÖVRIG INFORMATION

Comirnaty LP.8.1 är ett inaktiverat vaccin och kan ges samtidigt som ett eller flera andra inaktiverade och levande försvagade vaccin. Se även referens Janusinfo.

Comirnaty LP.8.1 är ett nukleosid-modifierat mRNA-fragment som kodar för SARS-CoV-2 spike-proteinet.

Den aktiva substansen i vaccinet är inkapslad i en lipiddroppe och är därför känslig för skakningar.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Folkhälsomyndigheten Rekommendationer om vaccination mot covid-19

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-vaccination-mot-covid-19/>

Internetadress Global information om Comirnaty

<https://www.comirnatyeducation.se/>

Janusinfo Allmän information om vaccinationer

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5465

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-09-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Vaccin: Comirnaty LP.8.1 intramuskulär inj 30 mikrog/dos mot covid-19, barn 12 - 18 år

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Comirnaty LP.8.1 (registrerad produkt)

30 mikrog/0,3 mL, Injektionsvätska, intramuskulär

Djupfryst vaccin (- 90 till - 60 °C) är hållbart 18 mån. Inom denna tid kan vaccinet förvaras 10 veckor i kylskåp. Innan första punktion kan flaskan förvaras 12 tim i rumstemp. Efter första punktion ska vaccinet förvaras i 2 - 30 °C, används inom 12 tim.