



Vaccin: M-M-RvaxPro intramuskulär/subkutan inj

mot mässling, påssjuka och röda hund

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Levande försvagat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

EN-STEGSSPÄDNING

M-M-RvaxPro		Medföljande vätska,		IM INJ
	+	förfylld spruta	=	1 dos
1 inj flaska		1 st		0,5 mL

Beredningsinstruktion:

Tillsätt hela volymen spädningsvätska i den förfyllda sprutan till flaskan med pulvret. Skaka försiktigt så att suspensionen blandas ordentligt. Dra sedan upp hela volymen i en spruta, byt nål och administrera vaccinet.

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion: vanligaste administreringsvägen

Barn under 1 år: Ges i mellersta delen av lårets utsida (anterolaterala delen).

Barn från 1 år: Ges i övre tredjedelen av överarmens utsida (i deltoideusmuskeln).

Subkutan injektion: rekommenderad administreringsväg för patienter med trombocytopeni eller koagulationssjukdom

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

M-M-RvaxPro (registrerad produkt)

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt.

1 dos, Injektionsvätska, intramuskulär

Färdigberett vaccin bör administreras direkt, men är hållbart 8 tim i kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Grundvaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet

Dos: 0,5 mL/dos

Dos 1: vid 18 mån ålder (tidigast vid 12 mån ålder)

Dos 2: i årskurs 1-2 (tidigast 4 veckor efter dos 1, det är dock en fördel med minst 6 månaders intervall)

ÖVRIG INFORMATION

De som är gravida, har allvarlig immunbrist, pågående immunsuppressiv behandling eller aktiv tuberkulos ska inte vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund. Vid infektion med hög feber bör vaccinationen skjutas upp. Om en patient fått immunglobulin ska det gå minst tre månader innan vaccination.

Vid utlandsresor finns risk att ett ovaccinerat barn får mässling. Vid stor risk för smitta rekommenderas en extra dos från 6 månaders ålder, i andra fall från 9 månaders ålder. En dos given före 12 månaders ålder räknas inte in i vaccinationsprogrammet utan ordinarie dos 1 ska ges efter 12 månaders ålder och därefter dos 2 i årskurs 1-2. Dos före 12 månaders ålder ska ordineras av läkare.

M-M-RvaxPro är ett levande försvagat vaccin och kan ges samtidigt som ett eller flera inaktiverade vaccin. Samtidig administrering som andra levande försvagade parenterala vaccin går också bra, men helst ges dessa med minst 4 veckors mellanrum. Se även referens Janusinfo.





Vaccin: M-M-RvaxPro intramuskulär/subkutan inj mot mässling, påssjuka och röda hund

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Folkhälsomyndigheten Barnvaccinationsprogrammet

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/>

Folkhälsomyndigheten Vaccination mot mässling

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationer-i-sverige/massling/>

Folkhälsomyndigheten Vaccinationsprogram för barn. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-en-kunskapsoversikt-for-halsovardspersonal/>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

<https://www.rikshandboken-bhv.se/vaccination/vaccinationsprogram/vacciner-i-det-allmanna-barnvaccinationsprogrammet/vaccin-mot-massling-passjuka-roda-hund/>

Janusinfo Allmän information om vaccinationer

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/>

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5467

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-10-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT